

千葉県の気象概況

2026 年(令和 8 年)9 月

目 次

・気象観測資料についての説明.....	1
・2026 年(令和 8 年)9 月の気象概況.....	2～8
・気象官署及び特別地域気象観測所の旬・月統計値表.....	9
・2026 年(令和 8 年)9 月の気象経過図.....	10
・2026 年(令和 8 年)9 月の気象分布図.....	11
・情報の閲覧・検索のご案内.....	12～13

銚子地方気象台

気象観測資料についての説明

◎気象官署の旬・月統計値表について

気 温: 日平均気温を平均して求めています。
(日平均気温は毎正時の 24 個の平均)
降 水 量: 日合計値を合計して求めています。
(日合計値は 0 時～24 時の合計)
日照時間: 日合計値を合計して求めています。
(日合計値は日照時間を含む毎正時の合計)
平 年: 平年値のことで 1991～2020 年の 30 年間の値
(30 個)を平均して求めた値です。
階級区分: 1991～2020 年の 30 年間の値を小さい方から順に並べ、
10 個ずつの 3 階級に分類し、小さい方から「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」に表しています。また「低い(少ない)」、「高い(多い)」方から出現率 10%の範囲をそれぞれ「かなり低い(少ない)」、「かなり高い(多い)」と表しています。

◎気象経過図について

銚子・千葉・館山・勝浦の気温(平均・最高・最低の本年値と平年値)、降水量、日照時間の 1 か月の経過をグラフで表します。

◎気象分布図について

気 温: 日平均気温を月平均して求めています。
(日平均気温は毎正時の 24 個の平均)
降水量: 日合計値を月合計して求めています。
(日合計値は 0 時～24 時の合計)
日照時間: 日合計値を月合計して求めています。
(日合計値は日照時間を含む毎正時の合計)
2021 年 3 月 1 日に銚子、千葉、館山、勝浦以外のアメダス観測地点では(以下、アメダス)日照計による日照時間の観測を終了し、2021 年 3 月 2 日から気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。これに伴いアメダスの日照時間の平年値も同日より推計値相当に補正したものに更新しました。

◎各資料に付加される記号等について

- ×: 欠測(休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合)
-]: 資料不足値(資料が許容範囲を超えて欠けた状態で観測及び統計した値)
-) : 準正常値(観測結果にやや疑問がある値及び資料が許容範囲内で欠けた状態で統計した値)

◎アメダス成田の日照時間について

日照時間の観測を行っていないため、日照時間のデータはありません。

資料の利用に関する注意事項

・本資料は、銚子地方気象台ホームページの利用規約に準拠します。
(「銚子地方気象台ホームページについて」 <https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/etc/coment.html>)

問い合わせ先: 銚子地方気象台
電 話: 0479-23-7705

© 銚子地方気象台 2026

2026 年（令和 8 年）9 月の気象概況

【1 か月の天気の特徴】

この月は、高気圧に緩やかに覆われ、晴れた日もありましたが、前線や低気圧、湿った空気、台風第 25 号が千葉県に接近した影響を受け、曇りや雨の日が多くなりました。このため、月降水量は県内の全ての観測所で平年の 3 倍以上となりました。

月平均気温は、銚子・千葉・館山・勝浦ともに平年並となりました。

月降水量は、銚子・千葉・館山・勝浦ともに平年に比べかなり多くなりました。

月間日照時間は、銚子・千葉・館山・勝浦ともに平年に比べかなり少なくなりました。

上 旬

この旬は、前線や低気圧、湿った空気の影響を受け、曇りや雨の日が続きました。6 日から 7 日は関東甲信地方を前線を伴った低気圧が通過し大雨となりました。特に南部では 300 ミリを超える大雨となった所がありました。

このため、旬の降水量は平年に比べかなり多く、日照時間は平年に比べかなり少なくなりました。

中 旬

この旬は、台風第 25 号や前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。20 日は台風第 25 号が日本の南を北上し、気圧の谷や湿った空気の影響を受け、激しい雨が降り、大雨となりました。

このため、旬の日照時間は平年に比べかなり少なくなりました。

下 旬

この旬は、期間のはじめに台風第 25 号が千葉県に接近したため、記録的な大雨となりました。以降、高気圧に緩やかに覆われ、晴れた日もありましたが、伊豆諸島付近に停滞した前線や気圧の谷、湿った空気の影響を受け、曇りや雨の日が多くなりました。

このため、旬の降水量は平年に比べかなり多く、日照時間は平年に比べかなり少なくなりました。

【9 月の気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位値の更新状況（3 位まで）】

銚子地方気象台

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月降水量の多い方から (mm)	677.5	535.8	521.0	1887～
年月	(2026/9)	(1925/9)	(1897/9)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月間日照時間の少ない方から (時間)	49.8	69.9	74.8	1899～
年月	(2026/9)	(1988/9)	(1921/9)	

千葉特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日降水量 (mm)	309.5	259.5	212.5	1966～
年月日	(2026/9/21)	(1996/9/22)	(2023/9/8)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月最大 24 時間降水量 (mm)	351.5	259.5	219.5	1966～
年月日	(2026/9/21)	(1996/9/22)	(2023/9/8)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月降水量の多い方から (mm)	771.5	403.5	395.0	1966～
年月	(2026/9)	(2015/9)	(1996/9)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月間日照時間の少ない方から (時間)	41.6	49.3	74.1	1966～
年月	(1988/9)	(2026/9)	(1967/9)	

館山特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日降水量 (mm)	314.0	242.5	241.0	1968～
年月日	(1996/9/22)	(2026/9/21)	(2026/9/7)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月最大 24 時間降水量 (mm)	339.0	315.0	310.0	1968～
年月日	(2026/9/7)	(1996/9/22)	(1972/9/16)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月降水量の多い方から (mm)	1092.0	509.5	440.5	1968～
年月	(2026/9)	(1982/9)	(2015/9)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月間日照時間の少ない方から (時間)	54.8	65.1	96.6	1968～
年月	(1988/9)	(2026/9)	(1982/9)	

勝浦特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日降水量 (mm)	326.0	277.5	266.0	1906～
年月日	(1996/9/22)	(1971/9/7)	(2026/9/7)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月最大 24 時間降水量 (mm)	403.0	326.0	318.0	1950～
年月日	(1971/9/7)	(1996/9/22)	(2026/9/7)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月降水量の多い方から (mm)	1010.5	638.2	621.0	1906～
年月	(2026/9)	(1929/9)	(1971/9)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月間日照時間の少ない方から (時間)	55.7	67.6	79.6	1913～
年月	(1988/9)	(2026/9)	(1951/9)	

【年間の気象官署および特別地域気象観測所の極値・順位値の更新状況（3位まで）】

銚子地方気象台

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月降水量の多い方から (mm)	707.5	677.5	627.1	1887～
年月	(1991/10)	(2026/9)	(1922/10)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月間日照時間の少ない方から (時間)	49.8	55.5	57.9	1899～
年月	(2026/9)	(1916/10)	(1921/6)	

千葉特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日降水量 (mm)	351.0	309.5	259.5	1966～
年月日	(2026/8/13)	(2026/9/21)	(1996/9/22)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月最大 24 時間降水量 (mm)	367.0	351.5	309.0	1966～
年月日	(2026/8/13)	(2026/9/21)	(2013/10/15)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月降水量の多い方から (mm)	771.5	607.5	532.0	1966～
年月	(2026/9)	(1991/10)	(2004/10)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月間日照時間の少ない方から (時間)	41.6	49.3	57.4	1966～
年月	(1988/9)	(2026/9)	(2003/7)	

館山特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
日降水量 (mm)	314.0	242.5	241.0	1968～
年月日	(1996/9/22)	(2026/9/21)	(2026/9/7)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月最大 24 時間降水量 (mm)	339.0	321.5	315.0	1968～
年月日	(2026/9/7)	(2013/10/15)	(1996/9/22)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月降水量の多い方から (mm)	1092.0	634.5	589.0	1968～
年月	(2026/9)	(2019/10)	(1991/10)	

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月間日照時間の少ない方から (時間)	54.8	65.1	67.7	1968～
年月	(1988/9)	(2026/9)	(1985/3)	


勝浦特別地域気象観測所

要素名／順位	1 位	2 位	3 位	統計期間
月降水量の多い方から (mm)	1010.5	799.5	719.0	1906～
年月	(2026/9)	(2004/10)	(1991/10)	

【話題】台風第 25 号


令和 8 年 9 月 20～21 日にかけて、台風第 25 号が千葉県に接近したため、記録的な大雨となりました。その台風経路図と解析雨量積算図は以下のとおりです。

○台風第 25 号の経路図（日時、中心気圧）



○解析雨量積算図

(9月20日から21日の48時間積算)



0.4- 6- 30- 60- 120- 180- 240- 300- 480 ミリ

解析雨量は、気象庁・国土交通省が保有する気象レーダーの観測データに加え、気象庁・国土交通省・地方自治体が保有する全国の雨量計のデータを組み合わせて、1時間の降水量分布を1km四方の細かさで解析したものです。

【報道発表】

10月1日、気象庁は9月の東日本太平洋側の記録的な多雨・日照不足に関して、報道発表しました。

東日本太平洋側では、統計を開始した1946年以降で9月の月降水量が最多、月間日照時間が最少となりました。この記録的な天候は、太平洋高気圧と一体化した優勢な高気圧の縁辺と日本の南海上の大規模な低圧部の東縁に沿って、暖かく湿った空気が流れ込み、本州付近に停滞した秋雨前線の活動が非常に活発となったためにもたらされました。

1. 天候の状況（図1、表1）

東日本太平洋側では、地域毎の統計を開始した1946年以降で9月の月降水量平年比が236%と最多（従来の記録は1982年の182%）となり、関東地方南部を中心とする气象台等の12地点で月降水量の多い方からの記録を更新しました。また、東日本と西日本では月間日照時間がかかなり少なく、東日本太平洋側では1946年以降で9月の月間日照時間平年比が46%と最少（従来の記録は1988年の54%）となりました。




図1：2026年9月の降水量平年比（上）と日照時間平年比（下）の分布図

表1：9月の月降水量の多い方からの記録更新地点（全国の153气象台等での観測値による）

地点名	降水量	平年比	平年値	これまでの最大		開始年
	mm	%	mm	mm	西暦年	
水戸	641.0	344	186.3	439.5	1897	1897
館野	542.0	289	187.6	530.2	1929	1921
銚子	677.5	313	216.3	535.8	1925	1887
東京	696.5	310	224.9	670.9	1958	1875
石廊崎	653.5	351	186.4	584.5	1982	1939
網代	834.5	316	263.9	540.5	1954	1937
横浜	785.5	325	241.5	609.0	1897	1897
館山	1092.0	492	222.0	509.5	1982	1968
勝浦	1010.5	411	245.6	638.2	1929	1906
大島	1933.0	566	341.3	1138.5	1982	1939
三宅島	1292.0	390	330.9	998.7	1957	1942
千葉	771.5	377	204.7	403.5	2015	1966

2. 大気の流れの特徴（図2）

日本付近の偏西風は日本の東海上を中心に平年よりかなり強く、本州付近は上昇気流が生じやすい場所となりました。これに加え、日本の東海上には太平洋高気圧と一体化した優勢な高気圧が停滞する一方、大陸からは秋の高気圧が張り出し、本州付近では南北の気温差が大きくなりました。このような気圧配置が月を通して現れ、秋雨前線が本州付近に長期間停滞しました。さらに、太平洋高気圧の縁辺と日本の南海上の大規模な低圧部の東縁に沿って、暖かく湿った空気の流れ込みが続いたことから、秋雨前線の活動が非常に活発になりました。また、台風第25号も太平洋高気圧の縁辺に沿って関東の南海上を北東進しました。




図2：2026年9月の特徴的な天候をもたらした大気の流れの模式図
（本図の作成には、異常気象分析検討会の協力を得ています）

報道発表資料全文は、以下からご覧いただけます。

<https://www.jma.go.jp/jma/press/2610/01a/tenko202610.html>



気象官署及び特別地域気象観測所の旬・月統計値表

2026年(令和8年)9月

銚子	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	24.3	24.8	平年並	272.0	51.0	かなり多い	15.0	62.4	かなり少ない
中旬	22.2	23.6	低い	157.0	77.9	多い	13.6	52.6	かなり少ない
下旬	22.7	21.7	高い	248.5	87.4	かなり多い	21.2	44.1	かなり少ない
月	23.1	23.4	平年並	677.5	216.3	かなり多い	49.8	159.0	かなり少ない


千葉	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	24.7	25.8	低い	215.0	68.5	かなり多い	12.0	51.5	かなり少ない
中旬	22.6	24.1	低い	179.5	67.4	多い	19.0	44.7	かなり少ない
下旬	22.5	21.6	高い	377.0	68.9	かなり多い	18.3	38.3	かなり少ない
月	23.2	23.8	平年並	771.5	204.7	かなり多い	49.3	134.6	かなり少ない

館山	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	25.0	25.5	低い	462.0	70.8	かなり多い	21.3	58.7	かなり少ない
中旬	23.1	24.0	低い	259.0	69.8	かなり多い	17.9	52.7	かなり少ない
下旬	22.7	21.6	高い	371.0	81.3	かなり多い	25.9	41.2	かなり少ない
月	23.6	23.7	平年並	1092.0	222.0	かなり多い	65.1	152.5	かなり少ない


勝浦	気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	24.8	25.1	低い	453.5	66.4	かなり多い	26.2	60.0	かなり少ない
中旬	22.6	23.7	低い	256.0	81.6	かなり多い	17.9	54.1	かなり少ない
下旬	22.9	21.6	高い	301.0	97.5	かなり多い	23.5	42.0	かなり少ない
月	23.4	23.5	平年並	1010.5	245.6	かなり多い	67.6	156.1	かなり少ない

2026 年（令和 8 年）9 月の気象経過図：2026 年 9 月 1 日～30 日


銚子




館山




勝浦




千葉




2026 年（令和 8 年）9 月の気象分布図



平均気温(°C)



降水量(mm)



日照時間(h)



情報の閲覧・検索のご案内

「千葉県的气象概況」に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下の各ページでご覧いただけます。

- ・気象庁HP (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>)
- ・銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/>)

【気象庁HPや銚子地方気象台HPでの観測データや予報などの検索や取得】

○観測データ

□ 過去の気象データ検索

昨日までの気象観測データ、平年値、観測史上1～10位の値等を検索できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)

□ 過去の気象データ・ダウンロード

昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を抽出して、数日間の平均・合計値などを集計し、平年値や最近の数年間平均値と比較できます。データはCSVファイルとしてダウンロードできます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>)

□ 天候の状況

低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均(合計)値やその平年差・平年比で検索できます。

気象庁HP

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

□ 生物季節観測の情報

さくらの開花、かえでの紅葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/data/seibutsu.html>)

○予測資料

- ・ 2週間気温予報

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweek/?fuk=0>)

- ・ 早期天候情報

気象庁HP (https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=0&elem=temp)

- ・ 季節予報

気象庁HP

(<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.5/137/&elem=temperature&pattern=P1M&term=0&contents=season>)

- ・ 2週目以降の気温の予測資料の検索

早期天候情報、1か月予報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得できます。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/risk/probability/index.html>)

○その他

☐ 地球環境・気候

異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

気象庁HP (<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

☐ 災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料

暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害に関する資料を閲覧できます。

気象庁HP (https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)

○千葉県内の気象観測施設配置図

銚子地方気象台HP (<https://www.data.jma.go.jp/choshi/shosai/bousai/amedas.html>)