

広島県の気象

2024 年（令和 6 年）年報


広島地方気象台

広島県の気象に関する問合せ

〒730 - 0012 広島市中区上八丁堀 6 - 30 広島合同庁舎 4 号館 14 階

広島地方気象台 防災管理官室 TEL 082 - 223 - 3953

気象観測施設配置図



資料解説

要素		解説
気温（℃）	平均気温	毎正時（24回）の平均
	最高気温	任意の時刻の最高値
	最低気温	任意の時刻の最低値
降水量（mm）	日降水量	毎正時（24回）の合計（0.5mm未満は0.0）
日照時間（h）		毎正時（24回）の合計

記号の説明	
値) 準正常値	統計を行う対象資料の一部が欠けているが、必要な資料数を満たす値
値] 資料不足値	統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている値
× 欠測（資料なし）	休止や測器の故障などで値が得られなかった場合

気象観測所一覧表

令和6年3月26日現在

観測所名		観測種目							所在地	北緯		東経		海面 上の 高さ	風向 風速 計の 高さ
地名	読み	気温	風	日照	降水量	積雪	湿度	その他		度	分	度	分	m	m
広島	ヒロシマ	○	○	○	○	○	○	□	広島市中区上八丁堀	34	23.9	132	27.7	4	95.4
呉	クレ	○	○	○	○		○	△	呉市宝町	34	14.4	132	33.0	4	27.3
福山	フクヤマ	○	○	○	○		○	△	福山市松永町	34	26.8	133	14.8	2	14.4
高野	タカノ	○	○		○	○	○		庄原市高野町新市	35	02.0	132	54.1	570	10.0
三次	ミヨシ	○	○		○		○		三次市三次町	34	48.7	132	51.0	159	9.9
庄原	ショウハラ	○	○		○		○		庄原市東本町	34	51.6	133	01.4	300	10.5
大朝	オオアサ	○	○		○	○	○		山県郡北広島町大朝字大坪	34	46.1	132	27.8	399	9.9
油木	ユキ	○	○		○		○		神石郡神石高原町安田伊ノ平谷	34	45.8	133	16.7	510	9.9
加計	カケ	○	○		○		○		山県郡安芸太田町加計字神田	34	36.6	132	19.2	210	9.9
三入	ミイリ	○	○		○		○		広島市安佐北区三入	34	32.7	132	31.8	70	6.3
世羅	セラ	○	○		○		○		世羅郡世羅町大字東神崎字大田	34	35.0	133	03.0	350	7.9
府中	フチュウ	○	○		○		○		府中市土生町	34	33.7	133	13.9	70	9.4
東広島	ヒガシヒロシマ	○	○		○		○		東広島市八本松町原	34	25.0	132	42.0	224	9.9
本郷	ホンゴウ	○	○		○				三原市本郷町善入寺平岩	34	26.1	132	55.1	331	10.0
廿日市津田	ハツカイチツタ	○	○		○		○		廿日市市津田	34	21.9	132	11.4	317	9.9
竹原	タケハラ	○	○		○		○		竹原市忠海床浦	34	19.8	132	58.9	5	9.9
生口島	イクチシマ	○	○		○		○		尾道市瀬戸田町御寺	34	16.7	133	07.4	3	9.9
大竹	オオタケ	○	○		○		○		大竹市立戸	34	13.3	132	13.2	1	25.0
呉市蒲刈	クレシカマガリ	○	○		○		○		呉市蒲刈町大浦字前沖浦	34	09.9	132	44.9	48	9.9
道後山	ドウゴヤマ				○				庄原市西城町三坂	35	03.4	133	11.3	729	-
君田	キミタ				○				三次市君田町櫃田字市井谷	34	55.7	132	49.8	304	-
東城	トウジョウ				○				庄原市東城町川東	34	53.7	133	16.6	310	-
八幡	ヤワタ				○	○			山県郡北広島町東八幡原	34	42.5	132	10.4	774	-
美土里	ミトリ				○				安芸高田市美土里町横田	34	43.3	132	39.3	318	-
王泊	オオトマリ				○				山県郡北広島町細見	34	41.9	132	18.7	525	-
都志見	ツシミ				○				山県郡北広島町都志見	34	38.8	132	26.6	400	-
甲田	コウダ				○				安芸高田市甲田町高田原	34	41.7	132	45.6	185	-
上下	ジョウゲ				○				府中市上下町上下	34	41.6	133	07.0	384	-
内黒山	ウチグロヤマ				○				山県郡安芸太田町大字横川字横川東平	34	35.8	132	10.6	987	-
佐伯湯来	サエキコキ				○				広島市佐伯区湯来町大字和田字中須賀	34	29.9	132	17.4	206	-
志和	シワ				○				東広島市志和町志和堀	34	29.9	132	39.6	215	-
安宿	アスカ				○				東広島市豊栄町安宿	34	34.0	132	50.3	363	-
倉橋	クラハシ				○				呉市倉橋町須川	34	05.5	132	29.3	3	-

観測種目 その他: □ (大気現象、生物季節観測、季節現象)

観測種目 その他: △ (大気現象)

北緯・東経は世界測地系

気象概況

令和6年の気象の特徴

- 平均気温 1～2月、4月、6～11月は多くの地点で「平年より高い」又は「平年よりかなり高い」階級となり、そのうち2月と4月、8～10月はすべての地点で「平年よりかなり高い」階級となった。また、年平均気温の高い値と9～10月の月平均気温の高い値がすべての地点で観測史上1位を更新した。
- 降水量 2～4月、6月、10～11月は多くの地点で「平年より多い」又は「平年よりかなり多い」階級となった。そのうち、11月は多くの地点で月降水量の多い値が観測史上1位を更新した。また、9月、12月は多くの地点で「平年よりかなり少ない」階級となった。
- 日照時間 5月、7～9月、12月は多くの地点で「平年より多い」又は「平年よりかなり多い」階級となった。また、4月と10月は多くの地点で「平年より少ない」又は「平年よりかなり少ない」階級となった。

	年平均気温(℃)	平年差(℃)	年降水量(mm)	平年比(%)	年間日照時間(h)	平年比(%)
広島	18.0	+1.5	1908.0	121	2162.8	106
階級	平年よりかなり高い		平年より多い		平年より多い	
庄原	14.5	+1.8	1745.5	117	1874.6	109
階級	平年よりかなり高い		平年より多い		平年よりかなり多い	

梅雨時期の状況

中国地方（広島県、岡山県、島根県、鳥取県）の梅雨入りは6月20日ごろで平年よりかなり遅く、梅雨明けは7月21日ごろで平年並となった。

梅雨入り	6月20日ごろ（平年よりかなり遅い）	昨年（5月29日ごろ）より22日遅い
	平年（6月6日ごろ）より14日遅い	
梅雨明け	7月21日ごろ（平年並）	昨年（7月16日ごろ）より5日遅い
	平年（7月19日ごろ）より2日遅い	

梅雨の時期（6～7月）の降水量と平年比

	実況値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級
広島	629.5	506.3	124	平年より多い
呉	603.0	469.3	128	平年より多い
福山	450.5	372.5	121	平年より多い

各月の気象概況

1 月

- 上旬 高気圧と気圧の谷や湿った空気の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。
 中旬 期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、期間の後半は前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。
 下旬 気圧の谷や寒気、湿った空気の影響で、曇りや雨、雪の日が多かった。

1 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	6.5	+1.1	42.5	92	140.7	102
	階級	平年より高い	平年並		平年並	
庄原	2.3	+1.3	73.5	103	107.4	120
	階級	平年よりかなり高い	平年並		平年より多い	

2 月

- 上旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、低気圧や気圧の谷、寒気の影響で、曇りや雨の日が多かった。
 中旬 高気圧と気圧の谷や湿った空気の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。
 下旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、湿った空気や寒気の影響で曇りや雨の日が多かった。

2 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	8.4	+2.2	141.5	221	139.0	99
	階級	平年よりかなり高い	平年よりかなり多い		平年並	
庄原	4.6	+2.6	117.0	163	104.4	98
	階級	平年よりかなり高い	平年よりかなり多い		平年並	

3 月

- 上旬 高気圧と気圧の谷や湿った空気の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。
 中旬 気圧の谷や寒気、湿った空気の影響で曇りや雨の日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
 下旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多かった。

3 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	9.6	+0.1	155.5	131	165.1	93
	階級	平年並	平年より多い		平年より少ない	
庄原	6.2	+0.6	159.0	157	158.1	102
	階級	平年並	平年よりかなり多い		平年並	

4 月

- 上旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、3日は大雨となった所もあった。
 中旬 気圧の谷や湿った空気の影響で曇や雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
 下旬 高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

4 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	17.5	+2.7	182.5	129	141.9	74
	階級	平年よりかなり高い	平年より多い		平年よりかなり少ない	
庄原	14.8	+3.4	186.0	176	148.9	82
	階級	平年よりかなり高い	平年よりかなり多い		平年より少ない	

5 月

- 上旬 高気圧と気圧の谷や湿った空気の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わった。
 中旬 気圧の谷や湿った空気、前線の影響で曇りや大雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
 下旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や湿った空気、前線の影響で曇りや雨の日が多く、27 日から 28 日にかけては大雨となった所もあった。

5 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	19.6	0.0	210.5	124	229.0	109
階級	平年並		平年より多い		平年より多い	
庄原	16.5	+0.1	141.0	100	225.9	115
階級	平年並		平年並		平年より多い	

6 月

- 上旬 高気圧と気圧の谷や湿った空気の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わり、8 日から 9 日にかけては大雨となった所があった。
 中旬 気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや大雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
 下旬 前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、21 日から 23 日にかけてと 28 日及び 30 日は大雨となった所があった。

6 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	23.5	+0.3	332.5	147	156.7	101
階級	平年より高い		平年より多い		平年並	
庄原	21.2	+0.9	282.0	150	160.2	115
階級	平年より高い		平年より多い		平年より多い	

7 月

- 上旬 高気圧と前線や湿った空気の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わり、1 日から 2 日にかけてと 10 日は大雨となった所があった。
 中旬 前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、11 日から 12 日にかけてと 14 日から 15 日にかけては大雨となった所もあった。
 下旬 高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気の影響で 24 日は大雨となった所があった。

7 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	28.9	+1.7	297.0	106	201.0	116
階級	平年よりかなり高い		平年並		平年より多い	
庄原	26.0	+1.8	249.5	100	157.9	107
階級	平年よりかなり高い		平年並		平年並	

8 月

上旬 気圧の谷や湿った空気の影響で曇や雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

中旬 湿った空気の影響で曇や大雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

下旬 高気圧と気圧の谷や湿った空気、台風第 10 号の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わり、24 日から 25 日にかけてと 29 日から 30 日にかけては大雨となった所があった。

8 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	30.7	+2.2	53.5	41	283.9	137
階級	平年よりかなり高い		平年より少ない		平年よりかなり多い	
庄原	27.1	+2.1	85.5	58	257.0	142
階級	平年よりかなり高い		平年より少ない		平年よりかなり多い	

9 月

上旬 高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

中旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、16 日は大雨となった所があった。

下旬 高気圧と前線や湿った空気、気圧の谷の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わり、21 日から 22 日にかけては大雨となった所があった。

9 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	28.8	+4.1	46.5	29	246.5	147
階級	平年よりかなり高い		平年よりかなり少ない		平年よりかなり多い	
庄原	24.9	+4.3	55.0	33	208.8	145
階級	平年よりかなり高い		平年よりかなり少ない		平年よりかなり多い	

10 月

上旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気、気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多く、3 日と 6 日から 7 日にかけては大雨となった所もあった。

中旬 高気圧と気圧の谷や湿った空気、前線の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わり、19 日は大雨となった所があった。

下旬 気圧の谷や湿った空気、前線の影響で曇りや雨の日が多かった。

10 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	21.3	+2.5	185.0	169	137.0	77
階級	平年よりかなり高い		平年より多い		平年より少ない	
庄原	17.2	+3.0	170.5	177	130.5	85
階級	平年よりかなり高い		平年より多い		平年より少ない	

11 月

- 上旬 高気圧と前線や湿った空気、気圧の谷の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わり、1 日から 2 日にかけては大雨となった。
- 中旬 気圧の谷や湿った空気、寒気の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
- 下旬 気圧の谷や湿った空気、寒気の影響で曇りや雨の日が多く、29 日は大雨となった所もあった。

11 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	14.3	+1.4	258.0	372	165.4	108
階級	平年より高い		平年よりかなり多い		平年より多い	
庄原	9.6	+1.4	182.0	264	130.6)	105
階級	平年より高い		平年よりかなり多い		平年並	

12 月







- 上旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や寒気、湿った空気の影響で北部を中心に曇りや雨の日が多かった。広島では 8 日に初雪を観測した(平年 12 月 8 日、昨年 12 月 17 日)。
- 中旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、寒気や湿った空気、気圧の谷の影響で、北部を中心に曇りや雨、雪の日が多かった。
- 下旬 高気圧に覆われて晴れた日もあったが、寒気や湿った空気、気圧の谷の影響で、北部を中心に曇りや雨、雪の日が多かった。

12 月	月平均気温(℃)	平年差(℃)	月降水量(mm)	平年比(%)	月間日照時間(h)	平年比(%)
広島	7.4	-0.1	3.0	6	156.6	111
階級	平年並		平年よりかなり少ない		平年より多い	
庄原	3.0	0.0	44.5	53	84.9	91
階級	平年並		平年より少ない		平年より少ない	

■表中の悦明

) : 準正常値] : 資料不足値
X : 欠測 // : 平年値なし


アメダス 気象分布図 2024 年



■図中の記号

) : 準正常値
X : 欠測
] : 資料不足値
// : 平年値なし


■階級区分 (平年と比べ)




アメダス 気象経過図 2024 年

アメダス 気象経過図：2024年01月-2024年12月


高野




三次




庄原




大朝



油木




加計




アメダス 気象経過図 2024 年

アメダス 気象経過図：2024年01月-2024年12月


三入




世羅




府中




東広島



本郷




廿日市津田




アメダス 気象経過図 2024 年

アメダス 気象経過図：2024年01月-2024年12月


広島




呉




福山




竹原



生口島




大竹



アメダス 気象経過図 2024 年

アメダス 気象経過図：2024年01月-2024年12月

呉市蒲刈



台風の状態

令和6年台風第10号


8月22日にマリアナ諸島で発生した台風第10号は、日本付近で動きが遅くなり、27日に非常に強い勢力となって奄美地方に接近した。その後、進路を北に変えて非常に強い勢力のまま九州南部に接近し、強い勢力で29日08時頃に鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した。上陸後は、遅い速度で勢力を弱めながら九州北部地方や四国地方を通過して東海沖へ進んだ。台風は8月30日21時に熱帯低気圧に変わり、9月2日03時まで不明瞭となった。

台風の発生、上陸、中国地方への接近数

	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
台風の発生数						2		2	6	8	3	4	1	26
平年		0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1
台風の上陸数* ¹									2					2
平年						0.0	0.2	0.6	0.9	1.0	0.3			3.0
中国地方接近数* ²									1					1
平年						0.1	0.2	0.6	0.8	1.1	0.3			3.0

*¹ 台風が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合

*² 鳥取県、島根県、岡山県、広島県のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合



台風経路図（台風第25号まで※）

※台風第14号～第25号は速報値。

経路の両端の○と□は台風の発生位置と消滅位置、数字は台風番号を示す。

主な災害の概況

2024/5/1 ～ 9/30 高温（長期） 酷暑害

気象概況

太平洋高気圧に覆われ気温が上昇した。

災害概況

総務省消防庁の報道発表資料「令和6年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況」によると、広島県で5月1日～9月30日までの間で熱中症による救急搬送状況、初診時における傷病程度別搬送人数の内訳は以下のとおり。

合計2,505名（死亡2名、重症55名、中等症1,011名、軽症1,437名、その他0名）

2024/6/29 ～ 7/2 大雨 浸水害 山がけ崩れ害

気象概況

6月29日から7月2日にかけて、梅雨前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、広島県では断続的に非常に激しい雨を伴う大雨となった。

災害概況

広島市で一部損壊1棟、海田町で2棟の床上浸水、福山市で2棟、東広島市で1棟の床下浸水が発生した。雨量による鉄道や道路の通行規制等が県内の多くの箇所が発生した。

2024/7/10 ～ 7/12 大雨 山がけ崩れ害 その他（雨害）

気象概況

7月10日夜には、日本海にある低気圧から延びる前線が中国地方まで南下し、11日かけて前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、広島県では局地的に非常に激しい雨を伴う大雨となった。前線は、11日午後には四国地方まで南下したが、12日の午前中は前線上に発生した低気圧の影響で、ふたたび沿岸部を中心に強い雨となった。

災害概況

尾道市瀬戸田町林の県道で道路が崩落し、走行中の乗用車1台が転落した。運転していた30代男性が右腕に擦り傷（軽傷）を負った。また、崩落の影響で水道管が破損し、島南部の約700世帯が断水した。雨量による鉄道や道路の通行規制等が県内の多くの箇所が発生した。

2024/7/14 その他（風） 強風 強風害

気象概況

山陰沖の停滞前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、北部を中心に大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生し、突風が発生した。

災害概況

三次市では、現地調査の調べで住宅の一部損壊3棟の被害があった。その他、農業用ハウス3棟が壊れるなどの被害があった。

2024/9/22 その他（風） 強風 強風害

気象概況

台風第 14 号から変わった温帯低気圧や低気圧から延びる前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んだため、広島県では大気の状態が非常に不安定となり、活発な積乱雲が発生し、突風が発生した。

災害概況

広島市佐伯区で駐車場（五日市港）に保管している車の海側のサイドガラス割れが 3 台、その他飛び石による傷が数台、また、築 40 年以上の古い建物の屋根の裏木の剥がれがあった。また、広島市西区、安佐南区、廿日市市において、腐朽した木の倒木や倒れやすい場所（斜面等）での倒木が数件あった。

2024/11/1 ～ 11/2 大雨 強雨 浸水害 山がけ崩れ害

気象概況

11 月 1 日から 2 日にかけて、東シナ海から九州南部にかけてのびていた停滞前線が、九州北部や中国、四国地方まで北上した。前線の北上と台風第 21 号から変わった前線上の低気圧の接近により、西日本には暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発となった。このため、広島県内の雨量観測地点の全てで 11 月の 24 時間降水量の 1 位の値を記録する大雨となった。

災害概況

広島市安佐南区八木町で太田川に係留していたボートの様子を見に行き、増水した川に流された行方不明者 1 人の人的被害が発生した。住家被害は三次市で一部損壊が 1 棟、海田町で床上浸水が 2 棟、床下浸水が 4 棟、大竹市で 4 棟の床下浸水が発生した。また、江田島市では県道沿いの斜面が崩れ、東広島市の山陽自動車道では、法面が崩れる土砂災害があった。その他、交通機関への影響は、JR は山陽新幹線、山陽本線、呉線、可部線、芸備線、福塩線で運休し、江田島市、尾道市、福山市、庄原市、安芸高田市、神石高原町で合計約 8,700 戸の停電が発生した。

注意報・警報発表状況

		広島市 中区	広島市 東区	広島市 南区	広島市 西区	広島市 安佐南区	広島市 安佐北区	広島市 安芸区	広島市 佐伯区	呉市	大竹市	廿日市	江田島市	府中町	海田町	熊野町	坂町	竹原市	東広島市	大崎町	三原市	尾道市	福山市	府中市	世羅町	神高町	安芸高田市	安芸太田町	北広島町	三次市	庄原市	
特別警報	暴風																															
	暴風雪																															
	大雨																															
	大雪																															
計	高潮																															
	波浪																															
	洪水																															
	計																															
注意報	風雪	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
	強風	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1	1	1	1	1
	大雨	18	22	16	17	22	20	16	19	18	13	18	13	13	14	13	12	13	25	8	19	19	26	13	8	7	19	16	15	16	10	
	大雪					2	2		2		1	4						3		2			4	4	4	5	5	5	6	6		
	高潮	31		31	31			31	31	14	31	31	31		31		31	5	5	37	31	31	20									
	波浪	28		28	28			28	28	28	28	28	28		28		28	28	28	28	28	28	28									
	洪水	4	8	8	4	5	10	6	6	7	5	8	2	4	4	4	4	7	11	2	10	8	15	6	9	8	11	6	8	14	15	
	着雪					2	2		2		1	4						1					1	1	1	4	4	4	6	6		
	乾燥	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	3	3	3	3	3
	濃霧	16	15	16	16	15	15	16	16	16	16	16	8	15	16	15	16	16	16	8	16	16	16	15	15	15	52	52	52	52	52	
	霜	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	なだれ											5															1	5	5		1	
	融雪																															
	低温	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	着氷																															
	雷	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	96	96
	計	303	251	305	302	252	255	303	310	289	301	320	288	238	299	238	297	275	295	289	312	308	311	245	243	241	207	203	204	209	205	

発表対象外

気象情報発表状況

中国地方対象

	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
気象情報		11		13	8	4	16	46	15	7	1	10	12	143
台風情報									17					17
天候情報							1	2		1				4
早期天候情報		4	3	4	7	5	2	6	9	9	8	3	2	62
黄砂情報				1	2									3
スモッグ気象情報							2		7	1				10

広島県対象

	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
気象情報		7	1	9	8	8	16	30	13	3	1	10	4	110
台風情報									16					16
潮位情報								1	1	1	1	1		5
天候情報		1												1
黄砂情報				1	2									3
竜巻注意情報					4			8	7	3				22
熱中症警戒アラート 運用期間 4/23～10/23								25	45	16				86

指定河川洪水予報発表状況

	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
太田川上流												2		2
三篠川												2		2
小瀬川								2				2		4
芦田川								2						2
江の川上流												3		3
馬洗川												2		2
黒瀬川水系黒瀬川								2				2		4
沼田川水系沼田川												2		2

土砂災害警戒情報発表状況

	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
土砂災害警戒情報								6	2			7		15

気象庁ホームページ等の気象データのご案内

「広島県の気象」に記載のないデータは気象庁ホームページ等からご覧ください。

1 過去の気象データ検索

(1) 気温、降水量などの観測データの表示、グラフ化

気象庁 過去の気象データ検索ページで「地点」、「年月日」、「データの種類」を選択します。

気象庁 過去の気象データ検索ページへのリンク

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=

(2) 広島県の天気、天気概況（昼、夜）、呉・福山の天気

・広島県の天気概況（昼、夜）

気象庁 過去の気象データ検索ページで「地点」「年月」「〇年〇月の日ごとの値を表示」を選択します。

・広島・呉・福山の天気

気象庁 過去の気象データ検索ページで「地点」「年月日」「〇年〇月〇日の1時間ごとの値を表示」を選択します。

気象庁 過去の気象データ検索ページへのリンク

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=

(3) 県内すべての地点における日別、月別の気温、降水量等の一覧

気象庁 過去の気象データ検索ページで「広島県全地点」「年月」「〇年の月ごとの値を表示」又は「〇年〇月の日ごとの値を表示」を選択します

気象庁 過去の気象データ検索ページへのリンク

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=

2 過去の気象データの表示・ダウンロード

気象観測データの中から、選択した地点・項目・期間のデータを画面に表示したり、CSV ファイルとしてダウンロードしたりすることができます。

気象庁 ダウンロードページへのリンク

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

※システム更新に伴うメンテナンス対応のため、2025年2月20日（木）より本ページの運用を当面の間休止します。「過去の気象データ検索」や「平年値ダウンロード」をご利用ください。

3 極値更新（地点ごとの観測史上1～10位の値）

気象庁 過去の気象データ検索ページで「地点」を選択し、「地点ごとの観測史上1～10位の値」を選択します。観測史上1～10位の値（月としての値）、又は観測史上1～10位の値（年間を通じての値）を表示します。

気象庁 過去の気象データ検索ページへのリンク

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=67&block_no=&year=&month=&day=&view=

4 生物季節観測（対象 うめ、そめいよしの、あじさい、すすき、いちょう、いろはかえで）

広島地方気象台 生物季節のページへのリンクからご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/hiroshima/seibutu.html>

5 広島県内で震度1以上を観測した地震

- ・広島地方気象台 定期刊行物のページへのリンクから「広島県の地震」をご覧ください。

https://www.data.jma.go.jp/hiroshima/teiki_index.html

- ・気象庁ホームページ 震度データベース検索ページへのリンクからも期間、震度、地域等を選択してご覧になれます。 <https://www.data.jma.go.jp/eqdb/data/shindo/index.html>