# 山 梨 県 気 象 旬 報
## 令和６年３月　上旬

甲　府　地　方　気　象　台　　令和6年3月11日発行

【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に覆われておおむね晴れとなりましたが、旬の後半には低気圧や前線の影響で雨や曇りとなる日もありました。
甲府の旬平均気温は低く、旬間日照時間は平年並、旬降水量は多くなりました。

【旬の値】

| | 気温（℃） | | | 日照（h） | | | 降水量（mm） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実況値 | 平年値 | 階級 | 実況値 | 平年値 | 階級 | 実況値 | 平年値 | 階級 |
| 甲府 | 5.8 | 7.2 | 低い | 69.4 | 63.9 | 平年並 | 45.0 | 33.6 | 多い |
| 河口湖 | 1.3 | 2.8 | 低い | 58.1 | 57.6 | 平年並 | 37.5 | 41.4 | 平年並 |

【日毎の概況】

| | 昼（06h00m～18h00m） | 夜（18h00m～翌06h00m） |
|---|---|---|
| 1日 | 雨一時曇後晴 | 曇時々晴 |
| 2日 | 晴時々曇 | 曇時々晴 |
| 3日 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 |
| 4日 | 晴一時曇 | 曇一時晴 |
| 5日 | 雨時々曇 | みぞれ一時雨 |
| 6日 | 雨時々みぞれ後曇 | 曇 |
| 7日 | 曇後一時雨 | 曇一時雨 |
| 8日 | 晴時々曇、雷を伴う | 曇時々晴 |
| 9日 | 晴一時曇 | 晴後時々曇 |
| 10日 | 晴一時曇 | 晴 |

アメダス　気象経過図：2024年03月01日-2024年03月10日

甲府




大泉




韮崎




勝沼




大月




古関




（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス　気象経過図：2024年03月01日-2024年03月10日

河口湖




切石




山中




南部




乙女湖




上野原




富士川




（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

## ■ 平均気温（℃）




| 地点名 | 実況値 | 平年値 | 平年差 |
|---|---|---|---|
| 大泉 | 1.5 | 3.0 | -1.5 |
| 韮崎 | 4.3 | 5.9 | -1.6 |
| 甲府 | 5.8 | 7.2 | -1.4 |
| 勝沼 | 4.9 | 6.1 | -1.2 |
| 大月 | 3.9 | 5.3 | -1.4 |
| 古関 | 2.5) | 4.5 | -2.0 |
| 切石 | 5.1 | 6.2 | -1.1 |
| 河口湖 | 1.3 | 2.8 | -1.5 |
| 山中 | 0.3 | 1.2 | -0.9 |
| 南部 | 6.3 | 7.2 | -0.9 |

階級区分

かなり低い　低い　平年並　高い　かなり高い　欠測等

| 記号 | 統計値区分 |
|---|---|
| D | 正常値 |
| -- | 現象なし |
| D) | 準正常値 |
| D] | 資料不足値 |
| X | 欠測 |
| // | 平年値なし |

## ■ 降水量（mm）




| 地点名 | 実況値 | 平年値 | 平年比(%) |
|---|---|---|---|
| 大泉 | 29.0 | 28.6 | 101 |
| 乙女湖 | 34.5 | 49.0 | 70 |
| 韮崎 | 48.5 | 36.2 | 134 |
| 甲府 | 45.0 | 33.6 | 134 |
| 勝沼 | 31.0 | 27.7 | 112 |
| 大月 | 44.0 | 35.5 | 124 |
| 上野原 | 46.5 | // | // |
| 富士川 | 56.5 | // | // |
| 古関 | 45.0) | 43.0 | 105 |
| 切石 | 51.5 | 48.2 | 107 |
| 河口湖 | 37.5 | 41.4 | 91 |
| 山中 | 69.0 | 65.1 | 106 |
| 南部 | 58.5 | 71.9 | 81 |

階級区分

かなり少ない　少ない　平年並　多い　かなり多い　欠測等

| 記号 | 統計値区分 |
|---|---|
| D | 正常値 |
| -- | 現象なし |
| D) | 準正常値 |
| D] | 資料不足値 |
| X | 欠測 |
| // | 平年値なし |

# ■ 日照時間（ｈ）




| 地点名 | 実況値 | 平年値 | 平年比(%) |
|---|---|---|---|
| 大泉 | 74.4 | 64.2 | 116 |
| 韮崎 | 60.7 | 60.1 | 101 |
| 甲府 | 69.4 | 63.9 | 109 |
| 勝沼 | 67.3 | 62.0 | 109 |
| 大月 | 58.7 | 57.3 | 102 |
| 古関 | 55.9 | 55.0 | 102 |
| 切石 | 68.1 | 57.0 | 119 |
| 河口湖 | 58.1 | 57.6 | 101 |
| 山中 | 50.7 | 53.4 | 95 |
| 南部 | 65.8 | 50.3 | 131 |




| 記号 | 統計値区分 |
|---|---|
| D | 正常値 |
| -- | 現象なし |
| D) | 準正常値 |
| D] | 資料不足値 |
| X | 欠測 |
| // | 平年値なし |

# ブドウ黒とう病の防除を徹底しましょう

昨年は、シャインマスカットを中心に県下全域で黒とう病が発生しました。

黒とう病菌は、結果母枝や巻きひげで越冬し、春に降雨があると越冬場所に胞子を作ります。胞子は降雨のたびに飛び散り、新しく伸びた葉や枝などの柔らかい部分に感染します。

黒とう病が発生したほ場では、病原菌が多く越冬していると思われます。今年の発生を抑えるため、発芽前からの防除を徹底しましょう。

この時期の対策として、まず、伝染源となる病班のある枝や巻きひげの除去を徹底しましょう。棚の支線や簡易雨よけの資材、ハウス跡の骨材に絡みついた枝や巻きひげも除去して下さい。また、除去した枝や巻きひげは、ほ場の外に持ち出して下さい。

薬剤防除は、発芽前の3月下旬を目安に、デランフロアブル200倍液を樹全体に十分かかるよう丁寧に散布して下さい。

その後は、ほ場での平均的な展葉枚数が2から3枚頃に、チオノックフロアブルまたはトレノックスフロアブル500倍液を散布します。

防除の詳細については、ブドウ黒とう病防除マニュアルまたは果樹病害虫防除暦をご覧下さい。また、薬剤散布のタイミングは地域や生育状況により異なりますので、最寄りのJAや普及センターの指導に従い実施して下さい。

農事メモのお問い合わせ先 山梨県農政部農業技術課 TEL：055－223－1616

## この資料について

### 掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

### 令和５年４月からの様式等の変更について

令和５年４月から東京管区気象台管内の気象台の作成する農業気象速報の様式等を統一することとなりました。これに伴い、資料の名称を「山梨県気象旬報」に変更しました。また、地域気象観測旬報（帳票）と季節予報等は、同様の情報を気象庁ホームページ等で入手・閲覧できるため、掲載を廃止しました。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html

気象庁ホームページ … 季節予報など
https://www.jma.go.jp/

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html）に準拠します。