

山 梨 県 気 象 旬 報

令和8年7月 上旬

甲 府 地 方 気 象 台

令和8年7月13日発行

【天気概況】

この期間の天気は、前線や湿った空気の影響で雨の日が多くなりましたが、旬の後半は、高気圧に緩やかに覆われて晴れた日もありました。

甲府の旬平均気温・旬間日照時間・旬降水量は、いずれも平年並となりました。

【旬の値】


	気温 (°C)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	24.2	24.9	平年並	46.6	44.9	平年並	49.5	54.5	平年並
河口湖	19.5	20.9	低い	31.4	41.6	平年並	55.0	66.3	平年並

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
1日	曇	雨
2日	雨後曇時々晴	曇一時雨
3日	曇後時々晴	曇時々雨
4日	曇一時雨	曇一時雨
5日	曇後時々雨	雨時々曇
6日	雨時々曇	雨後曇一時晴
7日	曇時々晴	曇一時雨
8日	曇時々晴	曇後一時晴
9日	曇後晴	晴時々曇
10日	晴	曇時々晴

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月10日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月10日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	20.5	21.2	-0.7
葦崎	23.2	23.6	-0.4
甲府	24.2	24.9	-0.7
勝沼	23.2	24.1	-0.9
大月	21.9	23.2	-1.3
古関	21.4	22.4	-1.0
切石	23.2	23.9	-0.7
河口湖	19.5	20.9	-1.4
山中	18.2	19.6	-1.4
南部	23.1	24.2	-1.1

階級区分

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	53.5	64.4	83
乙女湖	57.5	87.4	66
葦崎	42.5	60.9	70
甲府	49.5	54.5	91
勝沼	41.0	53.9	76
大月	61.5	61.4	100
上野原	46.0	//	//
富士川	57.0	62.8	91
古関	58.5	63.3	92
切石	64.5	66.7	97
河口湖	55.0	66.3	83
山中	66.0	82.7	80
南部	94.0	123.3	76

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間 (h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	42.2	44.3	95
葦崎	49.0	43.7	112
甲府	46.6	44.9	104
勝沼	40.7	45.1	90
大月	32.4	43.4	75
古関	38.6	46.1	84
切石	42.7	44.9	95
河口湖	31.4	41.6	75
山中	29.5	43.6	68
南部	29.7	35.1	85

階級区分

かなり少ない
 少ない
 平年並
 多い
 かなり多い
 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

クビアカツヤカミキリの侵入に警戒してください

クビアカツヤカミキリは、サクラやモモ、ウメなどのバラ科樹木に寄生するカミキリムシで、農業や生態系への深刻な悪影響を及ぼすことから、特定外来生物に指定されています。

成虫は2センチから4センチくらいの大きさで、体の色はツヤのある黒色ですが、胸の部分は赤く、コブ状の突起があるのが特徴です。

また、幼虫は、木の内部を食い進み、「フラス」と呼ばれる木くずとふんが混ざったおがくず状のものを大量に排出し、樹勢の低下や枯死といった被害をもたらします。

山梨県では現在のところ、発生は確認されていませんが、近隣県で被害が報告されており、発生に備え十分な警戒が必要です。

クビアカツヤカミキリと疑われる成虫を見つけたり、木の周りに大量のフラスを確認した場合は、速やかに最寄りの JA や普及センター、病虫害防除所へご連絡ください。

被害の拡大を防ぐためには、早期発見・早期防除が何より重要です。日頃から樹木の状態を確認するなど、日常的な観察にご協力をお願いします。

また、農業技術課では、ホームページに詳しい情報を掲載していますので、ぜひご確認ください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。