

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年4月前半

釧路地方気象台
令和7年4月16日

気象概況

4月1日から15日は、低気圧や気圧の谷の影響で、曇りや雨となる日が多かった。

上旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、おおむね「平年並」となった。

上旬の日照時間は、根室北部では、平年より「少ない」、根室中部と南部では、おおむね「平年並」となった。釧路地方と十勝地方では、おおむね「少ない」となった。

上旬

- 1日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 2日：低気圧の接近により、おおむね曇りで、ところどころで雪となった。
- 3日：低気圧の影響で、曇りまたは雪で、ところどころで雨となった。
- 4日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 5日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 6日：低気圧の接近により、晴れのち雨となった。
- 7日：低気圧を含む気圧の谷の中で、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。
- 8日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 9日：気圧の谷の影響で、晴れのち雨となった。
- 10日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 12日：気圧の谷の中で、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。
- 13日：気圧の谷の影響で、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。
- 14日：低気圧の接近により、曇りのち雨となった。
- 15日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。

【令和 7 年 4 月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)				日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)		階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	4.5	2.6 +1.9	かなり 高い	14.5	24.8 58		平年並	49.8	61.0 82	少ない
根室	3.9	2.0 +1.9	かなり 高い	17.0	20.7 82		平年並	55.6	58.7 95	平年並
帯広	6.4	4.0 +2.4	かなり 高い	11.0	16.5 67		平年並	62.7	65.5 96	平年並
広尾	5.3	3.6 +1.7	かなり 高い	21.0	31.5 67		平年並	52.0	60.8 86	少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和7年(2025年)

4月1日から10日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

4月11日から15日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）4月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月10日


釧路




根室



帯広




広尾




A map of Hokkaido, Japan, illustrating the average temperature in April across various locations. The map uses a color scale from -10°C (dark purple) to 35°C (red). Most locations are clustered between 0°C and 10°C. A legend box in the top left corner provides the title and unit.


Location	Average Temperature (°C)
網走	8.3
標津	3.1
根室中標津	3.5
根室	3.9
納沙布	3.3
別海	3.6
厚床	3.2
釧路	4.5
白糠	4.1
鶴居	4.2
中標別	4.5
阿寒湖畔	4.5
上標津	3.5
川湯	2.5
弟子屈	3.0
陸別	3.0
めかびら源泉郷	1.6
足寄	5.1
本別	5.1
上士幌	3.9
新得	5.1
鹿追	5.1
胸場	5.1
芽室	4.8
帯広	6.4
池田	5.6
浦幌	5.3
樺内	4.9
帯広泉	4.5
大井町	4.3
上礼	3.8
大樹	4.4
瓜尾	5.3
太田	4.0
知方字	3.5
静町	3.7
標茶	3.8
標津	3.1
根室中標津	3.5
根室	3.9
納沙布	3.3
別海	3.6
厚床	3.2
釧路	4.5
白糠	4.1
鶴居	4.2
中標別	4.5
阿寒湖畔	4.5
上標津	3.5
川湯	2.5
弟子屈	3.0
陸別	3.0
めかびら源泉郷	1.6
足寄	5.1
本別	5.1
上士幌	3.9
新得	5.1
鹿追	5.1
胸場	5.1
芽室	4.8
帯広	6.4
池田	5.6
浦幌	5.3
樺内	4.9
帯広泉	4.5
大井町	4.3
上礼	3.8
大樹	4.4
瓜尾	5.3



アメダス旬別値 2025年4月上旬 降水量 (mm)



アメダス旬別値 2025年4月上旬 降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

This map displays the average monthly sunshine hours for April 2025 across various municipalities in Hokkaido. The data points are color-coded according to the following scale:

Color	Range (Hours)
Dark Blue	10 - 20
Blue	20 - 30
Green	30 - 40
Yellow-Green	40 - 50
Yellow	50 - 60
Orange	60 - 70
Pink	70 - 80
Red	80 - 90

The highest recorded value is 87.9 hours in Sorachi, Sorachi-Kita, and the lowest is 32.0 hours in Nemuro.



アメダス旬集計値表

2025年4月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	4月10日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均					最低気温 の平均		
																	階級区分		階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	3.3	6.8	0.4	24.5	37.9	5	0	+1.9	かなり高い	+2.1	+2.1	67	平年並	86	少ない	-14	-20
		糸櫛別				26.0								78	平年並				
		標津	3.1	7.1	-0.4	29.0	50.4			+1.3	かなり高い	+1.3	+1.5	101	多い	90	少ない		
		上標津	3.5	8.7	-1.0	15.0	41.3			+2.6	かなり高い	+3.5	+2.2	51	平年並	87	少ない		
		中標津	3.5	8.7	-1.4	24.0	45.9	7	0	+1.9	かなり高い	+2.4	+1.6	85	平年並	89	少ない	-12	-13
	根室中標津	3.2	8.8	-2.2	19.5		4	0	+2.0	かなり高い	+3.1	+1.8	//		-11	-11			
	根室中部	別海	3.6	10.1	-1.8	29.5	52.3	3	0	+1.9	かなり高い	+3.4	+1.5	108	平年並	99	平年並	-12	-6
	根室	3.9	7.6	1.5	17.0	55.6	0	0	+1.9	かなり高い	+2.1	+2.3	82	平年並	95	平年並	-6	-3	
	根室南部	納沙布	3.3	7.2	0.4	15.0	58.1			+1.8	かなり高い	+2.3	+1.7	88	平年並	93	平年並		
厚床	3.7	8.8	-1.4	29.0	45.7	0	0	+2.1	かなり高い	+2.6	+1.4	112	平年並	87	少ない	-18	-4		
釧路地方	釧路北部	川湯	2.5	8.0	-2.3	8.5	40.7	5	11	+1.9	かなり高い	+1.9	+2.6	34	少ない	88	少ない	-19	-22
		弟子屈	3.0	8.3	-1.5	14.0	41.9			+2.2	かなり高い	+2.9	+2.2	50	平年並	84	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	1.5	7.2	-3.6	15.0	43.4	8	34	+1.3	高い	+1.6	+1.6	49	平年並	90	少ない	-16	-16
		標茶	3.8	10.1	-1.7	14.0	47.9	0	0	+2.1	かなり高い	+2.8	+2.0	54	平年並	93	平年並	-18	-8
		鶴居	4.2	10.3	-1.1	14.5	45.1	0	0	+2.1	かなり高い	+2.6	+2.1	54	平年並	81	少ない	-15	-4
		中徹別	4.5	11.7	-1.6	22.5	47.8	0	0	+2.5	かなり高い	+3.5	+2.4	78	平年並	86	少ない	-12	-7
		塘路				16.0								57	平年並				
		阿寒				17.5								59	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				32.5							113	平年並					
	榑町	3.7	9.1	-1.1	34.5	50.8			+2.0	かなり高い	+2.9	+1.9	140	多い	87	少ない			
	太田	4.0	9.4	-0.8	21.0	52.4	0	0	+2.2	かなり高い	+3.2	+1.5	73	平年並	93	少ない	-19	-5	
	釧路南西部	知方学	3.5	6.4	0.6	20.0	51.6			+2.2	かなり高い	+2.0	+1.9	86	平年並	82	少ない		
		鶴丘	4.3	9.6	-0.4	17.5		0	0	+2.2	かなり高い	+3.0	+1.7	//		-6	-2		
		二俣				23.5								89	平年並				
		白糠	4.1	9.3	-1.1	20.5	53.6	0	0	+2.1	かなり高い	+2.3	+2.0	86	平年並	87	少ない	-10	-2
釧路		4.5	8.6	0.8	14.5	49.8	0	0	+1.9	かなり高い	+2.2	+1.5	58	平年並	82	少ない	-3	-1	
十勝地方	十勝北部	三股				6.0							27	少ない					
		小利別				16.0								95	平年並				
		陸別	3.0	9.6	-3.4	21.5	43.3	1	0	+1.3	高い	+1.8	+1.0	125	多い	76	少ない	-16	-6
		ぬかびら源泉郷	1.6	8.0	-3.6	14.0	49.9	15	16	+1.3	高い	+2.3	+1.6	56	平年並	86	平年並	-9	-20
		柏倉				14.0								73	平年並				
		上蝶湾				17.0								85	多い				
		上士幌	3.9	10.1	-1.6	14.5	49.7	0	0	+1.8	かなり高い	+2.7	+1.2	82	平年並	82	少ない	-11	-3
		足寄	5.1	11.9	-0.6	16.0	50.0			+1.9	かなり高い	+2.4	+2.0	96	多い	78	少ない		
		新得	5.1	10.1	-0.2	6.5	59.6	0	0	+1.9	高い	+2.0	+1.3	33	少ない	101	平年並	-15	-3
		鹿追	5.1	10.1	0.0	9.5	67.1			+2.3	かなり高い	+2.2	+2.0	60	平年並	110	多い		
	十勝中部	押帯				12.0								69	平年並				
		本別	5.1	11.7	-0.5	19.0	56.1	0	0	+1.7	かなり高い	+2.2	+1.5	115	多い	88	少ない	-9	-1
		駒場	5.1	10.5	-0.5	13.5	61.9			+2.1	かなり高い	+1.9	+2.0	99	平年並	98	平年並		
		芽室	4.8	10.8	-1.2	12.0	64.5	0	0	+1.7	高い	+2.0	+1.2	71	平年並	101	平年並	-11	-3
		帯広	6.4	12.7	1.2	11.0	62.7	0	0	+2.4	かなり高い	+2.8	+2.1	67	平年並	96	平年並	-5	-1
		池田	5.6	11.5	-0.6	12.0	58.5			+2.6	かなり高い	+2.4	+2.0	71	平年並	89	少ない		
		留真				20.5								114	多い				
		浦幌	5.3	10.8	-0.1	21.0	53.8	0	0	+2.1	かなり高い	+2.0	+1.8	110	多い	82	少ない	-6	-1
		帯広泉	4.5	10.6	-1.3	12.0		1)	0	+2.1	かなり高い	+3.1	+1.7	//		-10	-7		
		糠内	4.9	11.6	-1.7	13.0	58.9			+2.3	かなり高い	+2.6	+1.8	71	平年並	91	平年並		
		大津	4.3	9.3	-0.4	27.0	54.2			+1.7	かなり高い	+2.1	+1.5	141	多い	86	少ない		
	十勝南部	上札内	3.8	9.4	-1.9	13.5	56.6	7	0	+2.0	かなり高い	+2.8	+1.6	60	平年並	90	少ない	-15	-15
		更別	4.3	10.1	-1.0	12.5	59.2			+1.9	かなり高い	+2.4	+1.6	65	平年並	93	少ない		
		大樹	4.4	10.4	-1.8	12.0	55.4	0	0	+2.1	かなり高い	+2.7	+1.9	61	平年並	93	少ない	-25	-11
		広尾	5.3	9.9	0.9	21.0	52.0	0	0	+1.7	かなり高い	+1.9	+1.5	67	平年並	86	少ない	-7	-5

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。