

2020年（令和2年）の長野県内の天候

令和3年1月7日
長野地方気象台

- ・年間を通して気温の高い状態が続いたため、年平均気温は、ほとんどの地点で【かなり高い】となりました。
- ・年降水量は、7月の活発な梅雨前線の影響等により、南部と中部を中心に【多い】または【かなり多い】地点が多くなりました。
- ・年間日照時間は、【平年並】の地点が多くなりました。
- ・2019/20年冬は冬型の気圧配置が続かず、寒気の流入が弱かったため、気温が高く、記録的な暖冬・少雪となりました。
- ・7月は活発な梅雨前線の影響で長期間にわたって大雨となり（「令和2年7月豪雨」）、甚大な被害が発生しました。

1. 季節ごとの概況

冬（2019年12月～2020年2月）

この冬は、冬型の気圧配置が続かず、天気は数日の周期で変わりました。寒気の流入が弱かったため平均気温は平年よりかなり高くなり、長野、松本、諏訪、軽井沢、飯田では統計開始以来、高い方から1位の記録を更新しました。最深積雪は平年よりかなり少なくなり、飯田、諏訪で統計開始以来、少ない方から1位の記録を更新（諏訪はタイ）しました。降雪量も平年よりかなり少なくなり、飯田で統計開始以来、初めて1cm未満となりました（統計開始は1960/1961年の冬）。

また、本州付近を低気圧や前線が通過する事が多かったため、降水量は南部で平年より多くなりました。一方、低気圧や前線の影響を受けにくかった北部から中部は平年より少ないまたは平年並になりました。

日照時間は平年より少ないまたは平年並になりました。

春（3月～5月）

この春は、低気圧や前線、高気圧が交互に通過したため天気は数日の周期で変わりましたが、4月に移動性高気圧に覆われて晴れた日が多かったため、日照時間は多くなりました。一方、低気圧や前線、湿った空気の影響で、3月は大雪、4月と5月は大雨となった日がありました。

気温は、3月に冬型の気圧配置が現れにくく、また、南からの暖かい空気が流れ込みやすかったため高くなり、5月も南からの暖かい空気に覆われやすく、高くなりました。このため春の気温は高くなりましたが、4月は大陸からの寒気の影響を受けやすかったため低くなり、月ごとの変動が大きくなりました。

夏（6月～8月）

長野県を含む関東甲信地方は6月11日ごろに梅雨入り（平年より3日遅く、昨年より4日遅い）、8月1日ごろ梅雨明け（平年より11日遅く、昨年より8日遅い）しました。7月は活発な梅雨前線の影響で、長期間にわたって大雨となりました（「令和2年7月豪雨」）。このため、夏の降水量は多くなりました。

6月上旬と8月は晴れた日が多くなりましたが、7月は梅雨前線や湿った空気の影響を受けやすかったため、夏の日照時間は平年並か平年より少なくなりました。

夏の平均気温は、6月と8月に記録的な高温となったため、高くなりました。

秋（9月～11月）

秋の前半は、低気圧や前線及び台風の影響により、曇りや雨の日が多くなりました。後半は、低気圧と高気圧の影響を交互に受けて、天気は数日の周期で変わりましたが、移動性高気圧に覆われて晴れる日が多くなりました。

秋の平均気温は、9月前半と11月後半を中心に南から暖かい空気が流れ込みやすかったため、高くなりました。降水量は平年並または少なくなり、日照時間は平年並または多くなりました。

2. 月ごとの概況

1月

冬型の気圧配置が続かず、低気圧や前線が本州付近を通過することが多かったため、天気は数日の周期で変わりました。気温は、期間を通して寒気の南下が弱く、低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだため、顕著に高くなり、月平均気温は長野県内の26の観測地点で、1月として統計開始以来、高い方から1位となりました。降水量は、北部の一部で少なかった他は、平年並か多くなりました。日照時間は、少なくなりました。降雪量は、多くの観測地点でかなり少なくなりました。

2月

高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。上旬と下旬には、一時的に冬型の気圧配置が強まり北部の山地で大雪となった日もありましたが、全般的には、冬型の気圧配置が続かず、寒気の影響は弱く、南から暖かい空気が流れ込んだ影響で、県内の観測地点の月平均気温は高くなりました。また、降雪量は多くの観測地点で少なくなりました。

3月

高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。気温は、冬型の気圧配置が現れにくく、南から暖かい空気が流れ込みやすかったためにかかなり高くなりました。長野、信濃町、飯山、白馬では月平均気温の高い方から3月として統計開始以来第1位を記録しました。29日は低気圧と寒気の影響により、大雪となった所がありました。

4月

高気圧と低気圧が日本付近を交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。上旬と下旬を中心に高気圧に覆われて晴れた日が多かったため、月間日照時間は多くなりましたが、中旬は本州付近を低気圧が発達しながらたびたび通過し、大雨となった日もありました。

また、大陸からの寒気の影響を受けやすかったため、月平均気温は低くなりました。

5月

月の前半は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりましたが、後半はオホーツク海高気圧が発生し、冷たく湿った気流の影響を受けた時期がありました。

また、低気圧や前線、気圧の谷の影響で大雨となった日もありましたが、月の前半を中心に高気圧に覆われて晴れた日が多くなり、日照時間は多くなりました。

気温は寒気やオホーツク海高気圧の影響により低くなった日もありましたが、南からの暖かい空気に覆われやすかったため、かなり高くなりました。

6月

上旬は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、中旬と下旬は梅雨前線や湿った空気の影響により曇りや雨の日が多く、大雨となった日もありました。

太平洋高気圧が日本の南で西へ張り出し、暖かい空気が入りやすかったため、月平均気温はかなり高くなりました。上旬を中心に晴れて強い日差しの影響を受けた日もあったことから、県内12カ所の観測地点で月平均気温の高い方から6月として観測史上1位を記録しました。

7月

梅雨前線や湿った空気の影響を受けやすかったため、曇りや雨の日が多くなり、大雨や雷雨となった日もありました。8日には大雨特別警報が発表されるなど、南部を中心に記録的な大雨となり、甚大な被害が発生しました。

北からの冷たい空気の影響を受ける時期もあったため、すべての観測地点で月平均気温が平年を下回りました。

月降水量はほとんどの観測地点でかなり多く、南信濃では平年の4倍を記録しました。

また、16カ所の観測地点で月降水量が年として観測史上1位となり、御嶽山では2208ミリに達し、これまでの記録を千ミリ近く上回りました。

月間日照時間はすべての観測地点で平年の半分を下回り、信濃町では平年の23%を記録しました。また、6カ所の観測地点で月間日照時間が少ない方から年として観測史上1位となりました。

長野地方気象台は、9日に「日照不足と長雨に関する長野県気象情報 第1号」を、22日に「日照不足と長雨に関する長野県気象情報 第2号」を発表しました。

8月

勢力の強い太平洋高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、午後は大気の状態が不安定となり、雨や雷雨となって激しく降る日もありました。中旬と下旬を中心に暖かい空気に覆われやすかったため、月平均気温はかなり高くなりました。このため、県内12観測地点で月平均気温の高い方から年を通しての観測史上1位の値を更新しました。月降水量は少なく、月間日照時間は多くなりました。

22日には、北佐久郡御代田町と安曇野市で突風が発生し、農業用ビニールハウスの倒壊や倒木などの被害がありました。

長野地方気象台は、19日に「長期間の高温に関する長野県気象情報 第1号」を、31日に「長期間の高温に関する長野県気象情報 第2号」を発表しました。

9月

本州付近に前線が停滞しやすく、高気圧の縁を回って湿った空気が入ったため、曇りや雨の日が多くなり、雷雨や大雨となった日もありました。気温は上旬を中心に高気圧の縁を回って暖かい空気が流入しやすかったことや台風に向かって南風が吹き込んだ時期があったため、高くなりました。1日から3日は台風第9号の影響により日最低気温が高くなった所があり、信濃町では日最低気温の高い方から年を通して観測史上1位の値を更新し、県内13観測地点で9月として観測史上1位の値を更新しました。

10月

上旬と中旬は気圧の谷や前線や湿った空気などの影響を受けやすく、曇りや雨の日が多くなりました。下旬は高気圧に覆われて晴れや曇りの日が多くなりました。

31日は晴れて放射冷却により気温が下がり、松本今井では日最低気温の低い方から10月として観測史上1位の値を更新しました。

11月

高気圧と低気圧や前線の影響を交互に受けたため、天気は数日の周期で変わりましたが、移動性の高気圧に覆われて晴れた日が多くなり、降水量は少なく、日照時間はかなり多くなりました。

月の前半は日本付近に寒気の流れ込んだ日がありましたが、中旬の後半を中心に北日本を通過する低気圧に向かって南からの暖かい空気が流れ込んだため、気温は高くなりました。特に、19日から20日は信濃町、飯山、信州新町では日最高気温の高い方から11月として第1位となりました。

12月

期間の前半は、高気圧と気圧の谷が交互に通過したため、天気は数日の周期で変わりました。期間の後半は冬型の気圧配置が強まったため、北部を中心に大雪となった所がありました。

上旬後半から中旬前半にかけては暖かい空気に覆われたため気温の高い日もありましたが、期間の後半は寒気の影響で気温が低くなりました。このため気温はほとんどの観測地点で平年並または低くなりました。降水量は北部のほとんどの観測地点で平年並で、中部と南部は平年より少なくなりました。日照時間は県の東側を中心に多くなりました。降雪量は北部の山沿いを中心に平年と比べて多くなりました。

3. その他

○ 桜（ソメイヨシノ）の開花日、満開日

	開 花			満 開		
長 野	本年(2020)	平 年	昨年(2019)	本年(2020)	平 年	昨年(2019)
	4月2日	4月13日	4月13日	4月13日	4月17日	4月18日

○ 梅雨入り・梅雨明け

	梅雨入り			梅雨明け		
関東甲信	本年(2020)	平 年	昨年(2019)	本年(2020)	平 年	昨年(2019)
	6月11日ごろ	6月8日ごろ	6月7日ごろ	8月1日ごろ	7月21日ごろ	7月24日ごろ

○真夏日・猛暑日・冬日・真冬日の日数

		長 野	松 本	諏 訪	軽井沢	飯 田
真夏日	本年(2020)	48	54	33	10	51
	昨年(2019)	48	46	32	6	54
	平年値	43.5	46.3	26.4	5.1	47.3
猛暑日	本年(2020)	12	11	1	0	11
	昨年(2019)	10	5	0	0	11
	平年値	3.2	3.8	0.2	0	2.6
冬 日	本年(2020)	85	97	87	157	78
	昨年(2019)	103	109	106	152	84
	平年値	104.6	116.8	114.1	155.2	94.4
真冬日	本年(2020)	4	0	1	6	0
	昨年(2019)	4	1	0	11	0
	平年値	7.1	2.9	6.0	20.2	1.5

真夏日とは日最高気温が30℃以上の日

猛暑日とは日最高気温が35℃以上の日

冬日とは日最低気温が0℃未満の日

真冬日とは日最高気温が0℃未満の日

○ 季節現象

	本年(2020)	平 年	昨年(2019)
初 霜	10月31日	10月28日	11月5日
初 氷	10月31日	11月5日	11月5日
初 雪	11月11日	11月17日	11月28日
※初冠雪	10月18日	10月22日	11月12日

※初冠雪は、長野地方気象台から東方に見える志賀高原の山々及び菅平の四阿山や根子岳を「東方連山」として観測

4. 気象官署、特別地域気象観測所における観測値の極値順位更新

○年の極値順位更新（5位以内）

要素	地点名	順位	値	起日	これまでの観測史上1位		統計開始年月
						年月日	
年平均気温の高い方から(℃)	長野	1位	13.1	2020年	13.1	2016年	1889/1
	松本	2位	13.1	2020年	13.2	2018年	1898/1
	諏訪	2位	12.2	2020年	12.3	2018年	1945/1
	軽井沢	2位	9.2	2020年	9.3	2018年	1925/1
	飯田	4位	13.7	2020年	13.8	2018年	1897/1
月平均気温の高い方から(℃)	長野	3位	27.2	8月	27.6	1994/8	1889/1
	松本	1位	27.0	8月	26.9	1994/8	1898/1
	諏訪	1位	25.6	8月	25.6	2010/8	1945/1
	軽井沢	2位	22.5	8月	22.8	2010/8	1925/1
	飯田	1位	27.0	8月	26.7	2010/8	1897/11
月降水量の多い方から(mm)	長野	3位	317.0	7月	323.8	1897/7	1889/1
	諏訪	4位	484.5	7月	506.5	2006/7	1945/1
	飯田	1位	734.0	7月	647.9	1950/6	1897/11
月間日照時間の少ない方から(h)	長野	3位	67.3	7月	55.1	1891/1	1889/11
	松本	3位	73.7	7月	61.6	1904/10	1899/1
	諏訪	1位	69.8	7月	82.8	1961/10	1945/1
	飯田	3位	64.4	7月	54.5	1918/6	1898/8
日最高気温の高い方から(℃)	松本	2位	38.1	8/15	38.5	1942/8/2	1898/1
日最低気温の高い方から(℃)	長野	3位	27.1	9/3	27.6	2019/8/15	1889/1
	松本	2位	25.7	8/11	25.9	2000/7/23	1898/1
	諏訪	4位	24.0	8/12	24.5	2018/7/20	1945/1
日最小相対湿度(%)	長野	2位	7	5/8	6	2006/3/25	1950/1
	松本	1位	5	5/3	5	2008/3/22	1950/1
	飯田	3位	6	4/9	4	2000/4/8	1950/1

○各月としての極値更新（1位）

1月

要素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位		統計開始年月
					年月日	
月平均気温の高い方から(℃)	長野	2.8	-	2.3	1989/1	1889/1
	松本	2.8	-	1.8	1988/1	1898/1
	諏訪	2.1	-	1.0	1989/1	1945/1
	軽井沢	-0.7	-	-1.2	1989/1	1925/1
	飯田	4.0	-	3.4	1989/1	1898/1

2月

該当なし

3月

要素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位		統計開始年月
					年月日	
月平均気温の高い方から(℃)	長野	6.2	-	6.2	2018/3	1889/3
日最低気温の高い方から(℃)	長野	11.2	10日	11.1	1914/3/24	1889/3
月最大24時間降水量(mm)	長野	35.5	29日	33.0	2018/3/9	1946/3
	軽井沢	61.0	29日	47.0	1980/3/22	1972/3

4月

要素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位		統計開始年月
					年月日	
月間日照時間の多い方から(h)	諏訪	253.1	-	252.6	1947/4	1945/4

5月

要 素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位	統計開始
					年月
日最小相対湿度(%)	長野	7	8日	9	2014/5/12
日最大10分間降水量(mm)	諏訪	16.0	6日	13.0	2003/5/8
日最大1時間降水量(mm)	諏訪	26.5	6日	20.8	1950/5/5

6月

要 素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位	統計開始
					年月
月平均気温の高い方から(℃)	飯田	21.8	-	21.8	2005/6

7月

要 素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位	統計開始
					年月
月間日照時間の少ない方から(h)	長野	67.3	-	80.9	1974/7
	松本	73.7	-	91.8	1902/7
	飯田	64.4	-	84.9	1903/7

8月

要 素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位	統計開始
					年月
日最低気温の高い方から(℃)	松本	25.7	11日	25.2	1979/8/5
日最大風速・風向(m/s)	飯田	15.1 北	22日	14.1 北	1908/8/8
日最小相対湿度(%)	飯田	19	18日	19	2004/8/25

9月

要 素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位	統計開始
					年月
日最低気温の高い方から(℃)	長野	27.1	3日	26.6	1954/9/14

10月

該当なし

11月

要 素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位	統計開始
					年月
月間日照時間の多い方から(h)	諏訪	205.3	-	200.1	1995/11
	軽井沢	203.7	-	200.9	1995/11
	飯田	194.4	-	188.7	2018/11

12月

要 素	地点名	値	起日	これまでの観測史上1位	統計開始
					年月
日最小相対湿度(%)	松本	9	24日	12	1985/12/29

月別の平均気温

上段:実況値℃(平年差℃)下段:階級区分

	長 野	松 本	諏 訪	軽 井 沢	飯 田
1月	2.8 (+3.4) かなり高い	2.8 (+3.2) かなり高い	2.1 (+3.4) かなり高い	-0.7 (+2.8) かなり高い	4.0 (+3.2) かなり高い
2月	2.4 (+2.3) かなり高い	2.9 (+2.7) かなり高い	2.0 (+2.6) かなり高い	-0.4 (+2.7) かなり高い	3.7 (+1.6) 高い
3月	6.2 (+2.4) かなり高い	6.3 (+2.4) かなり高い	5.8 (+2.4) かなり高い	2.8 (+2.3) かなり高い	7.3 (+1.7) かなり高い
4月	8.6 (-2.0) かなり低い	8.8 (-1.8) かなり低い	8.4 (-1.5) 低い	5.0 (-1.8) かなり低い	10.2 (-1.5) かなり低い
5月	17.7 (+1.7) かなり高い	17.9 (+1.9) かなり高い	16.6 (+1.6) かなり高い	13.0 (+1.2) 高い	17.7 (+1.3) かなり高い
6月	21.8 (+1.7) かなり高い	21.8 (+1.9) かなり高い	20.7 (+1.7) かなり高い	17.3 (+1.7) かなり高い	21.8 (+1.5) かなり高い
7月	22.9 (-0.9) 低い	22.9 (-0.7) 低い	21.5 (-1.2) 低い	18.7 (-0.8) 低い	22.8 (-1.1) 低い
8月	27.2 (+2.0) かなり高い	27.0 (+2.3) かなり高い	25.6 (+1.8) かなり高い	22.5 (+2.0) かなり高い	27.0 (+1.9) かなり高い
9月	22.7 (+2.1) かなり高い	22.0 (+2.0) かなり高い	21.1 (+1.6) 高い	17.6 (+1.3) 高い	22.4 (+1.2) 高い
10月	13.5 (-0.4) 平年並	12.8 (-0.4) 平年並	12.6 (-0.3) 平年並	9.6 (-0.4) 平年並	14.1 (-0.3) 平年並
11月	8.9 (+1.4) 高い	9.3 (+1.9) かなり高い	8.3 (+1.4) 高い	5.8 (+1.4) 高い	9.9 (+1.7) 高い
12月	2.0 (-0.1) 平年並	2.3 (0.0) 平年並	2.1 (+0.4) 平年並	-0.8 (-0.1) 平年並	3.5 (+0.3) 平年並
年	13.1 (+1.2) かなり高い	13.1 (+1.3) かなり高い	12.2 (+1.1) かなり高い	9.2 (+1.0) かなり高い	13.7 (+0.9) かなり高い

月別の降水量

上段:実況値mm(平年比 %)下段:階級区分

	長 野	松 本	諏 訪	軽 井 沢	飯 田
1月	28.5 (56) 少ない	49.0 (136) 多い	38.0 (87) 平年並	49.5 (150) 多い	63.0 (101) 平年並
2月	48.0 (96) 平年並	21.5 (49) 少ない	45.5 (89) 平年並	21.5 (53) 少ない	95.5 (123) 多い
3月	89.0 (150) かなり多い	74.0 (93) 平年並	95.0 (105) 平年並	101.5 (150) 多い	164.0 (120) 多い
4月	75.5 (140) 多い	93.5 (124) 多い	105.0 (120) 多い	97.0 (124) 多い	148.5 (117) 平年並
5月	53.5 (71) 少ない	58.5 (59) 少ない	99.5 (87) 平年並	111.0 (100) 平年並	137.5 (87) 平年並
6月	146.0 (134) 多い	164.5 (131) 多い	255.5 (156) かなり多い	232.0 (149) かなり多い	311.5 (153) 多い
7月	317.0 (236) かなり多い	289.0 (209) かなり多い	484.5 (253) かなり多い	397.5 (210) かなり多い	734.0 (340) かなり多い
8月	12.5 (13) かなり少ない	38.5 (42) 少ない	61.5 (48) 少ない	60.5 (38) 少ない	62.5 (45) 少ない
9月	129.5 (100) 平年並	100.0 (64) 少ない	92.0 (48) 少ない	113.0 (55) 少ない	104.5 (48) 少ない
10月	80.0 (97) 平年並	163.5 (160) 多い	202.5 (180) かなり多い	181.5 (151) 多い	261.0 (195) かなり多い
11月	14.0 (32) かなり少ない	7.0 (13) かなり少ない	29.0 (42) 少ない	20.0 (37) 少ない	51.5 (59) 少ない
12月	36.5 (80) 平年並	7.5 (27) 少ない	8.0 (23) かなり少ない	6.0 (22) 少ない	15.5 (30) 少ない
年	1030.0 (110) 多い	1066.5 (103) 平年並	1516.0 (118) 多い	1391.0 (112) 多い	2149.0 (133) かなり多い

月別の日照時間

上段:実況値h(平年比 %) 下段:階級区分

	長野	松本	諏訪	軽井沢	飯田
1月	112.5 (88) 少ない	148.6 (87) 少ない	165.8 (92) 少ない	154.8 (87) かなり少ない	160.3 (91) 少ない
2月	145.7 (111) 多い	187.3 (115) かなり多い	183.4 (106) 平年並	201.1 (115) 多い	175.1 (107) 平年並
3月	178.4 (106) 平年並	188.3 (102) 平年並	197.9 (103) 平年並	196.4 (106) 平年並	195.7 (110) 平年並
4月	216.6 (109) 多い	237.1 (117) 多い	253.1 (126) かなり多い	238.0 (118) 多い	243.5 (130) かなり多い
5月	221.5 (107) 多い	219.5 (105) 多い	217.9 (106) 多い	186.6 (97) 平年並	214.7 (111) 多い
6月	186.8 (113) 多い	181.5 (111) 多い	168.2 (105) 多い	138.1 (95) 平年並	173.7 (115) 多い
7月	67.3 (40) かなり少ない	73.7 (43) かなり少ない	69.8 (42) かなり少ない	54.4 (41) かなり少ない	64.4 (38) かなり少ない
8月	241.0 (118) 多い	237.9 (116) 多い	243.6 (122) 多い	234.7 (145) かなり多い	258.2 (129) かなり多い
9月	146.7 (104) 平年並	133.6 (94) 平年並	141.1 (98) 平年並	99.4 (82) 少ない	147.9 (105) 多い
10月	113.9 (75) かなり少ない	138.9 (87) 少ない	149.5 (93) 少ない	100.6 (70) かなり少ない	150.8 (99) 平年並
11月	168.1 (121) かなり多い	188.6 (118) かなり多い	205.3 (127) かなり多い	203.7 (131) かなり多い	194.4 (134) かなり多い
12月	150.6 (111) 多い	180.8 (109) 多い	204.6 (117) かなり多い	195.7 (112) 多い	187.8 (116) かなり多い
年	1949.1 (100) 平年並	2115.8 (101) 平年並	2200.2 (104) 多い	2003.5 (102) 平年並	2166.5 (107) 多い

) : 統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、その数が許容する範囲内(20%以下)である値。


(解説)

階級区分 「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の階級は、1981～2010年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる(各階級が10個ずつになる)ように決めている。また、値が1981～2010年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い(少ない)」「かなり高い(多い)」と表現する。

低い(少ない)		平年並	高い(多い)	
かなり				かなり

平均気温分布図(アメダス)

アメダス年別値 2020年 平均気温(℃)



かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い
資料年数が少ないため平年値または階級区分がないことを表す。


地点名	実況値	平年値	平年差(℃)
野沢温泉	10.5	10.5	0.0
信濃町	10.4	9.1	+1.3
飯山	12.4	11.0	+1.4
白馬	10.3	9.4	+0.9
長野	13.1	11.9	+1.2
大町	10.5	9.4	+1.1
信州新町	11.8	10.9	+0.9
菅平	7.2	6.4	+0.8
上田	12.8	11.9	+0.9
東御	10.1	9.3	+0.8
軽井沢	9.2	8.2	+1.0
松本	13.1	11.8	+1.3
松本今井	12.1	11.3	+0.8
立科	11.3	10.1	+1.2
佐久	11.8	10.6	+1.2
奈川	9.5	8.3	+1.2
諏訪	12.2	11.1	+1.1
開田高原	8.2	7.4	+0.8
木祖薮原	10.2	//	//
辰野	12.2	10.7	+1.5
原村	10.4	9.1	+1.3
野辺山	8.1	6.9	+1.2
木曽福島	11.6	10.5	+1.1
伊那	12.9	11.3	+1.6
南木曽	12.0	11.3	+0.7
飯島	12.0	10.9	+1.1
飯田	13.7	12.8	+0.9
浪合	10.0	9.3	+0.7
南信濃	13.7	12.6	+1.1

凡例

D	正常値
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

降水量分布図(アメダス)

アメダス年別値 2020年 降水量(mm)



かなり少ない 少ない 平常並 多い かなり多い
 : 資料年数が少ないため平年値または階級区分がないことを表す。


地点名	実況値	平年値	平年比(%)
野沢温泉	1725.5	1881.3	92
信濃町	1376.0	1262.1	109
飯山	1522.5	1446.4	105
小谷	2060.5	1995.2	103
白馬	1818.5	1904.7	95
鬼無里	1573.0	1627.1	97
長野	1030.0	932.7	110
笠岳	377.0]	1420.4	X
大町	1421.5	1397.1	102
信州新町	1024.0	1119.7	91
菅平	1283.0	1219.2	105
聖高原	1107.0	1156.5	96
上田	989.0	890.8	111
穂高	1040.5	1064.8	98
東御	1079.0	979.6	110
軽井沢	1391.0	1241.7	112
上高地	3167.5	//	//
松本	1066.5	1031.0	103
松本今井	1182.0	1106.8	107
鹿教湯	1375.5	1253.2	110
立科	1190.0	1040.8	114
佐久	1017.0	960.9	106
白樺湖	1989.0	//	//
奈川	2124.5	1962.3	108
諏訪	1516.0	1281.0	118
北相木	1104.0	//	//
開田高原	2691.0	2065.4	130
木祖藪原	2579.0	//	//
辰野	1813.0	1420.9	128
高遠	1535.0	//	//
原村	1432.0	1284.1	112
野辺山	1471.0	1439.9	102
御嶽山	4767.5	//	//
木曾福島	2402.0	1884.9	127
伊那	1644.0	1421.9	116
宮田高原	2887.5	//	//
杉島	1979.5	1506.5	131
須原	2436.5	2190.7	111
南木曾	2833.5	2413.7	117
飯島	2261.5	2007.2	113
大鹿	2385.5	1676.6	142
飯田	2149.0	1611.5	133
浪合	3306.0	2581.8	128
阿南	2626.5	1879.8	140
南信濃	2624.5	1814.0	145

■凡例

D	正常値
—	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

日照時間分布図(アメダス)

アメダス年別値 2020年 日照時間(h)



かなり少ない
 少ない
 平年並
 多い
 かなり多い

: 資料年数が少ないため平年値または階級区分がないことを表す。


地点名	実況値	平年値	平年比(%)
野沢温泉	1495.1	1587.1	94
信濃町	1556.1	1592.7	98
飯山	1672.9	1643.2	102
白馬	1575.0	1554.9	101
長野	1949.1	1939.6	100
大町	1774.2	1757.4	101
信州新町	1764.4	1698.0	104
菅平	1857.9	1894.9	98
上田	2237.2	2174.9	103
穂高	1929.8	1833.8	105
東御	2186.6	2074.9	102
軽井沢	2003.5	1968.8	102
松本	2115.8	2097.5	101
立科	2125.1	2089.5	102
佐久	2214.5	2059.5	108
奈川	1738.3	1694.5	103
諏訪	2200.2	2119.8	104
開田高原	1179.2	1668.5	71
木祖藪原	1685.0	//	//
辰野	2024.3	1948.2	104
原村	2154.7	2129.7	101
野辺山	2074.0	1924.4	108
木曽福島	1766.5	1776.9	99
伊那	2127.3	2094.1	102
南木曽	1623.4	1694.8	96
飯島	2127.9	2065.3	103
飯田	2166.5	2018.2	107
浪合	1595.6	1540.8	104
南信濃	1859.1	1885.3	99

■凡例

D	正常値
—	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

降雪量(積雪差合計)分布図(アメダス)

アメダス月別値 2019年12月～2020年2月 降雪量(積雪差合計) 平年比(%)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
野沢温泉	583	960	61
信濃町	283	625	45
飯山	294	707	42
小谷	300	711	42
白馬	158	532	30
長野	41	225	18
大町	90	416	22
菅平	384	495	78
軽井沢	56	94	60
松本	12	61	20
諏訪	6	87	7
開田高原	192	345	56
飯田	0	50	0

■凡例

D	正常値
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

○気象官署及び特別地域気象観測所における2020年の旬別気象経過図

地上気象 気象経過図：2020年01月上旬-2020年12月下旬



本資料に掲載している統計値等は、現時点で得られている資料を取りまとめた速報値です。

本資料の問合せ先：長野地方気象台 TEL 026-232-3773

(平日 08時30分～17時15分まで)