令和７年７月２日
名古屋地方気象台

東海地方の天候（令和７年６月）

１　概況

上旬の終わりから中旬の前半や下旬の中頃など、梅雨前線や湿った空気の影響を受けた時期があり大雨となった日もありましたが、６月としては高気圧に覆われやすく晴れた日が多くなりました。このため、月間日照時間はかなり多くなりました。また、暖かい空気に覆われやすく月平均気温はかなり高くなり、平年差+2.1℃と1946年の統計開始以降、６月として１位の高温となりました。なお、東海地方は９日ごろ梅雨入り（速報値）したと見られます。

月平均気温は「かなり高い」、月降水量は「平年並」、月間日照時間は「かなり多い」となりました。

旬ごとの概況	
上旬	旬の前半は、天気は数日の周期で変化しましたが、後半は梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。このため旬降水量はかなり多くなりました。 旬の平均気温は「平年並」、降水量は「かなり多い」、日照時間は「平年並」となりました。
中旬	旬の前半は、本州付近に停滞した梅雨前線や湿った空気の影響で大雨となった日もありましたが、後半は高気圧に覆われやすく晴れの日が多くなりました。このため、旬間日照時間は多くなりました。また、暖かい空気に覆われて猛暑日となった所もありました。このため、旬平均気温はかなり高く、平年差＋3.0℃と1946年の統計開始以降、6月中旬として1位の高温となりました。 旬の平均気温は「かなり高い」、降水量は「平年並」、日照時間は「多い」となりました。
下旬	旬のはじめと終わりは、高気圧に覆われやすく晴れた日が多くなったため、旬降水量は少なく、旬間日照時間はかなり多くなりました。中頃は前線や湿った空気の影響で猛烈な雨や非常に激しい雨が降るなど、大雨となった所がありました。また、暖かい空気に覆われたため、旬平均気温はかなり高くなりました。 旬の平均気温は「かなり高い」、降水量は「少ない」、日照時間は「かなり多い」となりました。

参考　時系列図（名古屋地方気象台）



最高・最低気温(太破線)、平均気温(太実線)と平年値(細破線)℃



降水量と平年値(破線)mm



日照時間と平年値(破線)h

2　大気の流れの特徴

６月の500hPa天気図（高度・偏差）と解説	
 等値線間隔　実況（実線）60m、偏差（破線）30m 陰影域は負偏差	500hPa高度では、中国東北区付近が気圧の谷となり平年より低くなった一方、日本付近は本州の東海上を中心に平年より顕著に高く、亜熱帯ジェット気流は日本付近で平年より北を流れやすくなりました。このため、日本付近は暖かい空気に覆われやすくなりました。また、東・西日本太平洋側や沖縄・奄美では太平洋高気圧に覆われやすくなりました。

3　各地の気象台・特別地域気象観測所の実況

地点名	平均気温（℃）	（平年差）（℃）	階級	降水量（mm）	（平年比）（%）	階級	降水日数 ≧1mm	日照時間（h）	（平年比）（%）	階級
静岡	24.9	(+2.5)	＋*	203.0	(75)	－	8	183.7	(135)	＋*
浜松	24.6	(+2.0)	＋*	201.5	(90)	○	9	193.1	(130)	＋*
御前崎	23.7	(+2.2)	＋*	232.0	(90)	○	9	202.5	(136)	＋*
三島	24.8	(+2.5)	＋*	180.0	(85)	○	11	173.7	(135)	＋*
石廊崎	23.7)	(+2.6)	＋*	166.0)	(70)	－	11)	186.5)	(132)	＋*
網代	24.0	(+2.6)	＋*	182.0	(72)	－	9	187.3	(147)	＋*
名古屋	24.9	(+1.9)	＋*	266.5	(143)	＋	10	188.5	(124)	＋*
伊良湖	24.0	(+1.8)	＋*	235.0	(131)	＋	11	202.1	(130)	＋*
岐阜	24.9	(+1.7)	＋*	379.0	(169)	＋*	11	189.7	(118)	＋*
高山	21.6	(+1.9)	＋*	357.5	(210)	＋*	9	168.9	(118)	＋
津	24.5	(+1.8)	＋*	234.5	(116)	＋	11	184.7	(126)	＋*
上野	23.8	(+2.0)	＋*	225.0	(116)	○	9	172.4	(130)	＋*
尾鷲	23.9	(+2.0)	＋*	211.0	(48)	－*	10	169.8	(137)	＋*
四日市	23.5	(+1.8)	＋*	292.5	(117)	＋	10	178.7	(121)	＋*
東海地方	----	(+2.1)	＋*	-----	(109)	○	---	-----	(130)	＋*

注）1. 平年値は1991～2020年の資料から求めた。
2. 「階級」の記号の意味は以下のとおり。
＋:高い（多い）　○:平年並　－:低い（少ない）
各階級の区分値は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が10個ずつになる）ように決めた。また、値が1991～2020年の観測値の上位または下位10%に相当する場合には階級の「＋－」に* を付加した。この場合には以下のように表現できる。
かなり高い（多い）　かなり低い（少ない）
3. 値の横に) や] がある場合は、月別値を求める際に使用したデータ（日別値）に欠測等が含まれていることを示す。）付きの値（準正常値）は通常のものと同様に扱うことができる。]付きの値（資料不足値）については、統計に用いる観測資料数が不足しているため、値の下に記載した統計日数（統計に用いた、品質が十分な日別値の数）を参考にするとともに、階級についても値と同様の品質であることに留意して使用されたい。なお、日別値がすべて欠測のため値が求められない場合は「×」とした。

４　令和７年（2025 年）６月の順位更新表

※順位の更新はタイ記録も含んでいる。タイ記録は「=」で表す。

月平均気温高い方からの順位更新

順位	地点名	平均気温 ℃	平年差 ℃	これまでの最高 ℃ （西暦年）	開始年	平年値 ℃
1	高山	21.6	+1.9	21.1 (2020)	1899	19.7
	岐阜	24.9	+1.7	24.6 (2020)	1883	23.2
	名古屋	24.9	+1.9	24.6 (2020)	1891	23.0
	上野	23.8	+2.0	23.4 (2020)	1937	21.8
	津	24.5	+1.8	24.3 (2020)	1890	22.7
	伊良湖	24.0	+1.8	23.8 (2020)	1947	22.2
	浜松	24.6	+2.0	23.8 (2020)	1883	22.6
	御前崎	23.7	+2.2	23.0 (2020)	1932	21.5
	静岡	24.9	+2.5	24.1 (2020)	1940	22.4
	三島	24.8	+2.5	23.9 (2020)	1930	22.3
	尾鷲	23.9	+2.0	23.7 (2020)	1939	21.9
	石廊崎	23.7	+2.6	22.5 (2020)	1939	21.1
	網代	24.0	+2.6	23.3 (1979)	1937	21.4
	四日市	23.5	+1.8	23.3 (2020)	1966	21.7

参考資料　平年並の範囲（東海地方）

６月	平均気温平年差	降水量平年比	日照時間平年比
上旬	-0.4 ～ +0.3℃	56 ～ 143%	85 ～ 111%
中旬	-0.3 ～ +0.2℃	70 ～ 121%	88 ～ 102%
下旬	-0.4 ～ +0.7℃	78 ～ 127%	91 ～ 109%
月	-0.1 ～ +0.3℃	86 ～ 114%	90 ～ 107%

資料の解説

・当資料に掲載されている天候の特徴や統計値は、現時点で得られている資料を取りまとめた速報です。

・「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991～2020 年における 30 年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が 10 個ずつになる）ように決めています。また、値が 1991～2020 年の観測値の下位または上位 10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。