

2025年 冬（12月～2月）の天候経過

令和7年3月3日
新潟地方気象台

1. 北陸地方の今冬（12月～2月）の特徴

【この冬は1月で冬型の気圧配置弱く 降雪量が平年並】

今冬は、1月で冬型の気圧配置が長続きしなかったが、12月と2月は冬型の気圧配置が続きやすく、2月では2度の寒波により降雪量はかなり多くなった。冬の平均気温及び降雪量は平年並、日照時間は少なく、降水量はかなり多かった。

2. 3か月平均(合計)と月別の平均気温・降水量・日照時間・降雪量の平年差(比)と階級

北陸地方平均	12～2月	12月	1月	2月
平均気温平年差	-0.2℃	-0.5℃	+0.8℃	-0.8℃
階級	平年並	低い	高い	低い
降水量平年比	130 %	131%	125 %	132 %
階級	かなり多い	かなり多い	多い	多い
日照時間平年比	95 %	66%	139 %	87 %
階級	少ない	かなり少ない	かなり多い	少ない
降雪量平年比	114 %	27%	48 %	238 %
階級	平年並	少ない	少ない	かなり多い

※北陸地方平均とは、北陸地方にある気象官署及び特別地域気象観測所(9地点)ごとの平年差(比)を平均したものです。

3. 月別の天候経過

(12月) 【低温・かなりの多雨・かなりの寡照・小雪 山沿い・山地は平年並から多雪】

冬型の気圧配置が続きやすく、曇りや雨の日が多く山沿いや山地中心に雪が降った。月の平均気温は低く、日照時間はかなり少なく、降水量はかなり多く、降雪量は少なかった。

(1月) 【冬型の気圧配置は長続きせず、高温・かなりの多照・多雨・少雪】

低気圧の影響を受け降水量が多かったが、冬型の気圧配置は長続きせず、1946年の統計開始以降、1月として2位となる記録的な多照となった。月の平均気温は高く、日照時間はかなり多く、降水量は多く、降雪量は少なかった。

(2月) 【2度の寒波の影響を受け 低温・寡照・多雨・かなりの多雪】

冬型の気圧配置が続きやすく中旬で高気圧に覆われた時期があった以外は、2度の寒波により大雪となった。月の気温は低く、日照時間は少なく、降水量は多く、降雪量はかなり多かった。

4. 参考資料




図1 新潟・富山・金沢・福井 旬平均気温・降水量・日照時間時系列

表 1 北陸地方における 12～2月の平均気温・降水量・日照時間

平均気温	12月		1月		2月		3か月平均	
	実況値 ℃	平年差 ℃ (階級)	実況値 ℃	平年差 ℃ (階級)	実況値 ℃	平年差 ℃ (階級)	実況値 ℃	平年差 ℃ (階級)
新 潟	4.9	- 0.4 (-)	3.4	+ 0.9 (+)	2.9	- 0.2 (〇)	3.7	0.0 (〇)
高 田	4.5	- 0.8 (-)	3.1	+ 0.6 (+)	2.0	- 0.7 (-)	3.2	- 0.3 (-)
相 川	6.6	- 0.2 (-)	5.0	+ 1.0 (+)	4.0	0.0 (〇)	5.2	+ 0.2 (〇)
富 山	5.2	- 0.5 (-)	3.9	+ 0.9 (+)	2.3	- 1.1 (-)	3.8	- 0.2 (〇)
伏 木	4.9	- 0.8 (-)	3.6	+ 0.7 (+)	2.0	- 1.3 (-)	3.5	- 0.4 (-)
金 沢	6.3	- 0.5 (-)	4.7	+ 0.7 (+)	3.4	- 0.8 (-)	4.8	- 0.2 (〇)
輪 島	5.8	- 0.1 (〇)	3.9	+ 0.6 (+)	2.8	- 0.6 (-)	4.2	0.0 (〇)
福 井	5.4	- 0.5 (-)	4.0	+ 0.8 (+)	2.4	- 1.3 (-)	3.9	- 0.4 (-)
敦 賀	7.1	- 0.3 (〇)	5.3	+ 0.6 (+)	3.8	- 1.3 (-)	5.4	- 0.4 (-)
北陸平均		- 0.5 (-)		+ 0.8 (+)		- 0.8 (-)		- 0.2 (〇)

降水量	12月		1月		2月		3か月合計	
	実況値 mm	平年比 % (階級)	実況値 mm	平年比 % (階級)	実況値 mm	平年比 % (階級)	実況値 mm	平年比 % (階級)
新 潟	262.5	116 (+)	291.0	161 (+*)	112.0	97 (〇)	665.5	128 (+*)
高 田	732.5	154 (+*)	407.0	95 (〇)	454.0	172 (+*)	1593.5	138 (+*)
相 川	236.0	134 (+)	244.5	186 (+*)	118.0	129 (+)	599.0	150 (+*)
富 山	378.5	134 (+*)	301.0	116 (+)	201.5)	117 (+)	881.0	125 (+*)
伏 木	332.5	113 (+)	352.0	129 (+)	218.5	135 (+)	903.0	125 (+)
金 沢	385.0	128 (+)	284.5	111 (+)	223.0	137 (+)	892.5	125 (+*)
輪 島	296.5	107 (〇)	302.0	138 (+)	130.5)	93 (〇)	729.0	115 (+)
福 井	481.0	158 (+*)	274.5	96 (〇)	243.0	145 (+*)	998.5	133 (+*)
敦 賀	428.5	135 (+)	252.0	94 (〇)	262.0	159 (+*)	942.5	127 (+)
北陸平均		131 (+*)		125 (+)		132 (+)		130 (+*)

日照時間	12月		1月		2月		3か月合計	
	実況値 h	平年比 % (階級)	実況値 h	平年比 % (階級)	実況値 h	平年比 % (階級)	実況値 h	平年比 % (階級)
新 潟	43.1	69 (-)	58.7	104 (〇)	84.8	114 (+)	186.6	96 (-)
高 田	48.6	67 (-)	79.3	127 (+)	73.5	88 (-)	201.4	91 (-)
相 川	28.9	57 (-*)	63.0	136 (+*)	61.5	89 (〇)	153.4	93 (-)
富 山	49.7	70 (-)	93.6	137 (+*)	73.3	82 (-)	216.6	94 (-)
伏 木	47.9	72 (-)	90.0	147 (+*)	73.9	86 (-)	211.8	99 (〇)
金 沢	40.9	59 (-*)	92.5	148 (+*)	74.0	86 (-)	207.4	95 (-)
輪 島	32.9	69 (-)	57.9	139 (+*)	47.3	69 (-*)	138.1	87 (-)
福 井	47.6	66 (-)	101.0	154 (+*)	74.8	85 (-)	223.4	99 (〇)
敦 賀	47.6	66 (-*)	98.9	158 (+*)	70.4	87 (〇)	216.9	100 (〇)
北陸平均		66 (-*)		139 (+*)		87 (-)		95 (-)

注 1) 平年値は 1991～2020 年の資料から求めています。

注 2) 階級欄の符号は、以下の事を示します。

(-) : 低い (少ない) , (〇) : 平年並 , (+) : 高い (多い)

(-*) : かなり低い (かなり少ない) , (+*) : かなり高い (かなり多い)

注 3) 値の横に) や] がある場合には使用したデータに欠測等が含まれていることを示し、×は欠測を示します。

) 付きの値は正常の値とみなせますが、] 付きの値は欠測等が多いため正常な値と同等とはみなせません。

このため、統計日数 (統計に用いた品質が十分な日数) を气象台等に確認して、品質を確かめてください。







図2 日降雪量・日最深積雪時系列（新潟・富山・金沢・福井）

表2 北陸地方における12～2月の冬日・真冬日・雪の各日数

	冬 日						真冬日		雪日数					
	12月		1月		2月		12～2月		12月		1月		2月	
	実況値	平年値	実況値	平年値	実況値	平年値	実況値	平年値	実況値	平年値	実況値	平年値	実況値	平年値
新 潟	1	4.1	8	14.9	14	15.1	0	0.4	24	19.5	26	26.8	25	23.5
高 田	5	5.7	16	16.8	18	18.6	0	0.4	22	16.6	23	25.2	26	21.1
相 川	0	1.6	3	7.9	11	10.2	0	0.1	22	14.9	23	23.6	22	19.9
富 山	2	4.0	6	13.2	18	15.0	0	0.5	17	13.1	22	23.4	21	19.4
伏 木	2	4.7	6	13.9	19	15.1	0	0.6	20	12.4	22)	21.0	24	17.6
金 沢	0	1.6	2	8.7	14	9.9	0	0.1	19)	14.5	22	22.7	24	19.9
輪 島	0	4.0	6	13.3	18	15.5	0	0.3	21	19.0	25	26.4	25	21.9
福 井	1	2.9	6	11.9	17	13.8	0	0.2	19	13.2	22	23.2	26	19.5
敦 賀	0	0.7	2	5.4	8	5.2	0	0.0	8	11.9	20)	16.5	22	13.7

※ 高田・相川・伏木・輪島・敦賀の雪日数平年値は、観測の自動化に伴い他の観測地点の統計期間とは異なります。

※ 冬日とは、日最低気温が0℃未満の日。真冬日とは、日最高気温が0℃未満の日。

表3 北陸地方における12～2月の降雪量・最深積雪

降雪量	12 月		1 月		2 月		12～2 月	
	実況値 (c m)	平年比% 階級	実況値 (c m)	平年比% 階級	実況値 (c m)	平年比% 階級	実況値 (c m)	平年比% 階級
新 潟	6	32(0)	37	59(-)	90	188(+)	133	102(0)
高 田	29	43(-)	82	48(-)	268	193(+*)	379	102(0)
相 川	2	22(0)	27	96(0)	66	264(+*)	95	153(+)
富 山	29	59(0)	62	60(-)	183	218(+*)	274	117(0)
伏 木	27	59(0)	55	51(-)	179	252(+*)	261	118(0)
金 沢	2	8(-*)	14	21(-*)	133	251(+*)	149	104(0)
輪 島	—	0(-*)	12	22(-*)	86	205(+*)	98	88(0)
福 井	6	19(-)	24	28(-)	137	236(+*)	167	97(0)
敦 賀	—	0(-*)	24	44(-)	143	333(+*)	167	142(+)
北陸平均		27(-)		48(-)		238(+)*		114(0)

最深積雪	12 月		1 月		2 月		12～2 月	
	実況値 (c m)	平年比% 階級	実況値 (c m)	平年比% 階級	実況値 (c m)	平年比% 階級	実況値 (c m)	平年比% 階級
新 潟	5	63(0)	22	96(0)	63	274(+*)	63	197(+)
高 田	13	41(-)	24	30(-)	138	145(+)	138	138(+)
相 川	1	20(-)	24	218(+*)	40	400(+*)	40	250(+*)
富 山	14	61(0)	21	53(-)	72	185(+)	72	141(+)
伏 木	15	68(0)	24	51(-)	63	170(+)	63	117(0)
金 沢	2	18(-)	6	22(-*)	42	191(+)	42	135(+)
輪 島	—	0(-*)	4	18(-*)	32	168(+)	32	119(0)
福 井	3	21(-)	13	33(-)	52	153(+)	52	111(0)
敦 賀	—	0(-)	17	65(0)	40	143(+)	40	103(0)

注1) 平年値は1991～2020年の資料から求めています。

注2) 階級欄の符号は、以下の事を示します。

(-) : 低い(少ない), (0) : 平年並, (+) : 高い(多い)

(-*) : かなり低い(かなり少ない), (+*) : かなり高い(かなり多い)

注3) 値の横に「や」がある場合には使用したデータに欠測等が含まれていることを示し、×は欠測を示します。

) 付きの値は正常の値とみなせますが、] 付きの値は欠測等が多いため正常な値と同等とはみなせません。

このため、統計日数(統計に用いた品質が十分な日数)を气象台等に確認して、品質を確かめてください。

表 4 北陸地方における 12～2 月の累年極値・順位（3 位以内）更新

冬（12 から 2 月）の順位更新なし

月間日照時間多い方からの順位更新

月	順位	地点名	日照時間 h	平年比 %	これまでの最大 h（西暦年）	開始年	平年値 h
1	1	伏木	90.0	147	89.6（1932）	1893	61.1
	2	金沢	92.5	148	94.0（1932）	1891	62.3
		富山	93.6	137	97.3（2014）	1939	68.1
		福井	101.0	154	103.5（1909）	1898	65.4
	3	敦賀	98.9	158	100.9（1979）	1914	62.6

（注）値の横に「」がある場合には、月別値を求める際に使用したデータ（日別値）に欠測等、統計に用いなかった値が含まれている（資料不足値）。順位は更新順位以上になることは確実であるが、統計値の使用に際しては気候表に記載した統計日数を参照されたい。平年値とは 1991～2020 年の 30 年間の値を平均したものである。

表 5 初冠雪

山岳名	観測気象官署	今季	昨季	平年	これまでの最早
立山	富山地方気象台	11. 8	10. 8	10. 12	1981. 9. 14
白山	金沢地方気象台	11. 8	10. 8	10. 21	1913. 9. 1

表 6 初霜・初氷・初雪

		初霜			初氷			初雪		
		今季	昨季	平年	今季	昨季	平年	今季	昨季	平年
新潟県	新潟	11. 26	12. 5	11. 27	12. 13	12. 18	12. 3	11. 18	12. 1	11. 23
富山県	富山	12. 12	11. 21	11. 25	12. 12	12. 24	12. 2	12. 8	12. 17	12. 3
石川県	金沢	12. 10	X	12. 4	12. 13	12. 28	12. 13	12. 8	12. 17	11. 24
福井県	福井	X	12. 28	11. 28	12. 23	12. 18	12. 3	12. 8	12. 17	12. 3

（注）霜、結氷、雪の値 ----- は現象なし、× は欠測を示す。

5. 天候情報発表状況

なし

（注）この季節のまとめは、北陸地方の気象官署および特別地域気象観測所における気象観測値等をまとめたものです。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがあります。